

FLUIMUCIL 600 mg pezsgőtabletta



Köptető hatású készítmény, amely a légutakban levő nyák elfolyósításával megkönnyíti a légutak tisztulását.

Hosszabb ideig kizárólag orvosi utasításra, az orvos által előírt adagban és ideig alkalmazható – kiegészítő kezelésként.

Gyermekeknek a Fluimucil 600 mg pezsgőtabletta nem adható!

14 éves kor alatti gyermekek kezelésére a Fluimucil 100 mg granulátum alkalmas.

14 éves kor feletti gyermekek kezelésére a Fluimucil 200 mg granulátum alkalmas.

A készítmény hatóanyaga (acetilcisztein) iránti túlérzékenység esetén alkalmazása ellenjavallt.

Fenilketonuriában (aminosav–anyagcsere-zavarban) szenvedő betegek a készítményt aszpartam tartalma miatt nem szedhetik.

A pezsgőtablettát egy üres pohárba kell helyezni, és fél pohár vizet ráöntve, elkeverve kell feloldani. Étkezés előtt kell meginni.

Az elkészített oldat – a feloldott hatóanyag (acetilcisztein) bomlása miatt – azonnal felhasználandó!

A gyógyszeres oldatot melegíteni tilos!

Tejben – kicsapódás veszélye miatt – nem szabad feloldani!

Ha az orvos másképp nem rendelkezik, szokásos adagja:

Felnőtteknek

Akut (rövid ideig tartó) megbetegedésekben Naponta 1–szer 1 db pezsgőtabletta.

Alkalmazása során ritkán előfordulhat gyomortáji panasz, hányinger, hányás. Érzékeny egyénekben allergiás reakciók, mint pl. bőrkkiütés, viszketés vagy a légutak fokozott ingerlékenysége léphet fel. Ezekről, valamint egyéb szokatlan tünetekről kezelőorvosát értesíteni kell.

Asztmában és gyomorfekélyben szenvedő betegek csak orvosi ellenőrzés mellett használhatják.

Terhességről és szoptatásról a kezelőorvost tájékoztatni kell, ilyenkor ugyanis csak az

orvos kifejezett utasítása esetén szedhető. Terhesség első harmadában szedése nem ajánlott.

Más gyógyszerekkel egyidejűleg alkalmazni csak az orvos tudtával szabad, mivel az együttes alkalmazás során módosulhat a gyógyszerek hatása.

Ha az orvos antibiotikum kezelést is előír (pl. penicillinszármazékok, cefalosporinok, aminoglikozidok, makrolidok, tetraciklinek, amfotericin B), a kétféle gyógyszert nem szabad egyidőben bevenni, mivel így egymás hatását csökkenthetik. Legalább 2 óra időköz legyen az antibiotikum és a Fluimucil 600 mg pezsgőtabletta bevétele között.

A készítmény nyákolódó hatása már órákon belül jelentkezik, ez gyakran a köhögés fokozódásában nyilvánul meg, mivel a hatás lényege a letapadt sűrű nyák mozgósítása.

A tüdőben a gázeloszlás változik, a légzés nehezebbé válhat. Ilyenkor a következő adaggal várni kell a váladék kiköhhögéséig és az eredeti állapot visszaállásáig. Javulás a második – harmadik napon várható, amikor a frissen keletkezett légúti váladék már hígabb, s kevésbé viszkózus.

A keletkezett váladékot fel kell köhögni és kiköpni, így a váladék tüdőben való felgyülemelése elkerülhető.

Az enyhe kénhidrogén illat, amely az alufólia kinyitásakor észlelhető, gyorsan eltűnik, a gyógyszer hatékonyságát nem befolyásolja, ugyanúgy, mint az oldat esetleges rózsaszínű elszíneződése sem.

Eltartása: szobahőmérsékleten.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni!

OGYI T.: 4949

Betegájékoztató OGYI-eng. száma: 1566c/40/96.