

Lymphomyosot®

cseppek

(Biologische Heilmittel Heel GmbH)

Homeopátiás gyógyszerkészítmény

Növényi-, állati- és ásványi eredetű anyagok felhasználásával készült, belsőleg használatra szánt alkoholos oldat.

Összetétel: 100 g oldat hatóanyagtartalma: Veronica officinalis D3 5,0 g; Equisetum hyemale D4 5,0 g; Smilax utilis D6 5,0 g; Calcium phosphoricum D12 5,0 g; Natrium sulfuricum D4 5,0 g; Fumaria officinalis D4 5,0 g; Levothyroxin D12 5,0 g; Geranium robertianum D4 10,0 g; Ferrum iodatum D12 10,0 g; Gentiana lutea D5 5,0 g; Aranea diadematus D6 5,0 g; Myosotis arvensis D3 5,0 g; Teucrium scorodonia D3 5,0 g; Pinus sylvestris D4 5,0 g; Scrophularia nodosa D3 5,0 g; Juglans regia D3 5,0 g; Nasturtium officinale D4 10,0 g.

Alkoholtartalom: 29 g/g %

1 ml oldat 0,28 g alkoholt tartalmaz

1 ml = 22 csepp

30 ml = 28,65 g; 100 ml = 95,50 g

Javallatok: A szervezet öngyógyító törekvésének serkentése a nyirokszövet túltengése (lymphatismus), műtétek vagy sérülések utáni nyirokszövet-duzzanat (lymphoedema) és más mirigyduzzanatok esetén. Mandula meg-nagyobbodás, krónikus mandulagyulladás. Kötőszöveti (mesenchyma) sa-laktalanítás. Az immunrendszer kifejezett gyengesége.

Nyaki nyirokcsomó-gümőkór (scrofulosis) kiegészítő kezelése.

Ellenjavallatok: Pajzsmirigy-megbetegedésben kizárólag az orvos javas-latára és ellenőrzése mellett, az előny/kockázat gondos mérlegelése alapján alkalmazható.

Terhesség, szoptatás:

A terhesség és szoptatás időszakában való alkalmazásáról nem állnak ren-delkezésre klinikai adatok.

-Heel



Adagolás: Ha az orvos másképpen nem rendeli, szokásos adagja naponta 3-szor 15-20 csepp. A cseppeket étkezés előtt 1/2 órával, kevés vízzel vagy anélkül kell bevenni.

Akut tünetek fellépésekor negyedóránként 15 csepp, max. 2 órán keresztül. A panaszok enyhülésével az alkalmazás gyakorisága csökkentendő.

Figyelmeztetés: A készítmény alkalmazása előtt kérje az orvos tanácsát. A gyógyszer egyszeri adagja 0,18 g (15 csepp), ill. 0,25 g (20 csepp) alkoholt tartalmaz, ezért nem alkalmazható alkoholelvonó kezeléssel (Antaethyl, azaz diszulfiram) egyidejűleg.

Az alkalmazás kezdetén jellemző módon sor kerülhet a panaszok átmeneti erősödésére. Hosszabb ideig tartó alkalmazása esetén nem kívánt hatások (gyógyszervizsgálati tünetek) léphetnek fel. Ezekről, ill. minden nem várt tünetről tájékoztassa kezelőorvosát.

A homeopátiás gyógyszer alkalmazásával egyidőben ($\pm$ 1/2 óra) tilos illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) cukorkát szopogatni és nem szabad intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását. Amennyiben a panaszok a kezelés ellenére fennállnak, ismételt orvoshoz kell fordulni.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni. A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Eltartása: szobahőmérsékleten (15–25 °C).

Megjegyzés: vény nélkül is kiadható.

Csomagolás: 30 ml, 100 ml.

OGYI-HG-056/01-02

Alkalmazási és beteg tájékoztató OGYI-eng. száma: 11920/74/98

