

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA CANESTEN krém klotrimazol

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körülményeként alkalmazása.

- *Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei 2-4 héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.*
- *Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.*

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Canesten krém és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Canesten krém alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Canesten krémet?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Canesten krémet tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CANESTEN KRÉM ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Canesten krém hatóanyaga, a klotrimazol széles spektrumú ún. antimikotikum.

Alkalmaz a bőr gombás megbetegedéseinek, fertőzésének kezelésére és a gombás fertőzéstől sérült bőr ápolására a szőrrel nem fedett bőrfelületen, hajlatokban, lábujjközökben, köröm/körömágy mentén, illetve a nem gombás eredetű bőrgyulladás (erythrasma) kezelésére.

Alkalmazható továbbá a külső nemi szervek gyulladással, fertőzőes gombás betegségeire, a szexuális partner egyidejű helyi kezelésére és a Canesten hüvelytabletta kiegészítéseként.

2. TUDNIVALÓK A CANESTEN KRÉM ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a Canesten krémet

- ha allergiás (túlérzékeny) a klotrimazolra vagy a Canesten krém egyéb összetevőjére.

A Canesten krém alkalmazásával kapcsolatos óvintézkedések:

- A készítmény csak külsőleg alkalmazható.
- Ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön a szembe és a nyálkahártyákra (szájüreg belseje, hüvely).
- Külső nemi szerveken történő alkalmazásának ideje alatt a latex anyagú fogamzásgátló eszközök (gumióvszer, pesszárium) biztonságossága csökkenhet. Ez a hatás átmeneti és csak a kezelés időtartamára korlátozódik.
- A cetilsztearil-alkohol helyi bőrreakciókat okozhat (pl.: kontakt dermatitisz). Cetilsztearil-alkohol érzékenység esetén a Canesten oldatot kell használni a krém helyett.

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

A Canesten krém csökkenti azon készítmények hatását, melyek szintén a gombás megbetegedések kezelésére használatosak.

Terhesség és szoptatás

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A készítmény rendeltetésszerű alkalmazása esetén a hatóanyagoknak igen kis mennyisége szívódik fel, így nem valószínűsíthető az ártalmassága.

Ennek ellenére a terhesség első három hónapjában és a szoptatás időszakában csak a kezelőorvossal történt megbeszélés alapján alkalmazható.

Szoptatás ideje alatt az emlők területén nem alkalmazható.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A CANESTEN KRÉMET?

Az érintett bőrterületre naponta 2-3 alkalommal vigye fel vékony rétegben a krém és finoman

dörzsölje be. Egy tenyérynyi bőrfelület kezelésére általában 0,5 cm-nyi krém elegendő.

Hüvelyfertőzés esetén a külső nemi szerveket naponta 2-3 alkalommal kell a krémmel kezelni.

Az újrafertőzés megakadályozása érdekében szükséges a szexuális partner egyidejű kezelése Canesten krémmel.

A beteg bőrfelületet minden kezelés előtt le kell mosni és gondosan meg kell szárítani.

A kezelés időtartama változó, függ a megbetegedés súlyosságától, mértékétől és helyétől.

Fontos a krém előírás szerint, rendszeresen, megfelelő ideig használni.

A tünetek a különböző gombás megbetegedéseknél 2-4 hét alatt, a külső nemi szervek esetében 1-2 hét alatt múlnak el.

A teljes gyógyulás érdekében a kezelést a tünetek megszűnése után célszerű még 2 hétig folytatni.

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Canesten krém is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Ritkán felléphetnek bőrreakciók a kezelés területén, mint égő, csípő érzés, viszketés, bőrkiütés, bőrvörösség.

A cetilsztearil-alkohollal szembeni túlérzékenység (allergia) esetén a Canesten oldatot kell alkalmazni a krém helyett.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesitse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A CANESTEN KRÉMET TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 30°-on tárolandó.

A dobozon, tubuson feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne alkalmazza a Canesten krémet.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Canesten krém?

- A készítmény hatóanyaga: 1 g krém 10 mg klotrimazolt tartalmaz (200 mg klotrimazol van 20 g vízzel lemosható krémben)
- Egyéb összetevők: oktil-dodekanol, cetilsztearil-alkohol, cetil-palmitát, szorbitán-sztearát, poliszorbát 60, tisztított víz. Tartósítószer: benzilalkohol.

Milyen a Canesten krém külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Leírás: 20g homogén, fehér krém.

Csomagolás: 20g krém alumínium tubusban, mely műanyag csavaros kupakkal van lezárva.

1 tubus dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja

Bayer Hungária Kft.

1123 Budapest Alkotás u. 50.

Gyártó:

Kern Pharma SL,

08228 Terrassa (Barcelona),

Spanyolország

OGYI-T-8110/01

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2008.05.28.

Bayer