

# Rowachol<sup>®</sup> cseppek

## BETEGTÁJÉKOZTATÓ

*Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.*

*E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.*

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.*
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.*

### **Milyen betegségek esetén használható és hogyan fejt ki hatását a Rowachol<sup>®</sup>?**

A Rowachol<sup>®</sup> csepp máj- és epebetegségek (pl. epekő, epegörcs, epehólyag- és epevezeték gyulladás, májgyulladás) kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény.

### **Milyen hatóanyagokat és segédanyagokat tartalmaz?**

*Hatóanyag:* az oldat 1 g-jában:

170,00 mg pinenum ( $\alpha+\beta$ ) 50,00 mg camphenium, 20,00 mg cineolum, 320,00 mg mentholum, 60,00 mg menthonum, 50,00 mg borneolum.

*Segédanyag:* olivaolaj.

### **Milyen esetekben nem használható?**

A készítmény összetevőivel szembeni túlérzékenység esetén.

Ellenjavallt az epeutak elzáródása okozta sárgaság esetén, máj- és veseelégtelenségben.

Terhesség első harmadában.

Gyermekkorban.

### **Miről kell feltétlenül tájékoztatnia a kezelőorvost a Rowachol<sup>®</sup> szedése előtt?**

Ha a készítmény bármelyik összetevőjével szemben (különösen a mentol) túlérzékeny.

## **Szedhet-e egyéb gyógyszert a Rowachol®-al egyidőben?**

Kerülendő a Rowachol® szedésével egyidejűleg véralvadástgátlók szedése, ismert májkárosításban, olyan gyógyszerek szedése, amelyek a májban bomlanak le, valamint olyan készítményekkel, melyeknél az adag nagyon pontos beállítása szükséges.

A gyógyszer tartós szedése cukorbetegség szénhidrát anyagcseréjét kedvezően befolyásolja, így – egyes esetekben – a cukorbetegség miatt szedett gyógyszerek adagjának csökkentése válhat szükségessé. Ezért cukorbetegség a gyógyszer tartós használatáról tájékoztassák kezelőorvosukat.

## **Alkalmazható-e terhesség és szoptatás ideje alatt?**

Bár magzatkárosító hatásról nem számoltak be, a Rowachol® adása a terhesség első harmadában nem javasolt. Szoptatás idején alkalmazása nem javasolt. A terhesség második-harmadik harmadában csak kifejezett orvosi javallatra alkalmazható.

## **Hogyan kell használni a Rowachol®-t?**

Ha az orvos másképp nem rendel, szokásos adagja felnőtteknek naponta 3-szor 3–5 csepp oldat étkezés előtt fél órával.

Epegőrcs esetén 20–30 csepp, amely 20 perc múlva megismételhető.

A kezelés idején zsír- és koleszterinszegény étrendet tanácsos tartani.

## **Milyen nemkívánatos mellékhatások léphetnek fel a Rowachol® szedése közben?**

Borsmenta vagy kámfor íz érzet, mely csökkenthető, ha étkezés előtt fél órával veszi be a cseppet, ritkán gyomorégés.

## **Mi a teendő, ha elfelejti bevenni a Rowachol®-t?**

A következő adagot vegye be a megszokott időpontban, ne vegyen be egyszerre két adagot.

## **Mik a túladagolás tünetei, mi ilyenkor a teendő?**

Az illóolajok nagy adagban a központi idegrendszer működését gátolják, ami légzési elégtelenséghez, bódultsághoz, a görcskészség fokozódásához vezethet. Túladagolás esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz.

## **Hogyan kell tárolni a Rowachol®-t?**

Szobahőmérsékleten (max. 25 °C-on) tárolandó.

A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni!

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A forgalombahozatali engedély jogosultja:

Rowa Pharmaceuticals Ltd.

Newtown, Bantry, Co. Cork, Írország.

**ROWA®**  
PHARMACEUTICALS LIMITED  
Bantry, Co Cork, Ireland

OGYI-T-8559/01

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 5665/40/2002

Hungary L/2b 02-03  
Hungary L/2b 02-03