

## BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

**Olvasza el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő bevétele.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

### **A betegájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer a Rowatinex kapszula és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Rowatinex kapszula szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Rowatinex kapszulát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Rowatinex kapszulát tárolni?
6. További információk

### **1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A ROWATINEX KAPSZULA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?**

A Rowatinex vese- és húgyúti megbetegedések (pl. vesekő, vagy a húgyvezetékben lévő kő és az ezekhez kapcsolódó tünetek) kezelésére, valamint az újbóli kőképződés gátlására, továbbá enyhe húgyúti fertőzésben a vizeletelválasztás elősegítésére szolgáló gyulladáscsökkentő és enyhe antibakteriális hatású, simaizmok görcsét oldó gyógyszerkészítmény.

### **2. TUDNIVALÓK A ROWATINEX KAPSZULA SZEDÉSE ELŐTT**

#### **Ne szedje a Rowatinex kapszulát**

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a Rowatinex kapszula egyéb összetevőire.
- ha máj-, illetve veseelégtelenségben szenved.
- terhesség első harmadában.
- szoptatás ideje alatt.
- gyermekkorban.

Súlyos görcsök, súlyos húgyúti fertőzések és a vizeletelválasztás megszűnésének kezelésére a gyógyszerkészítmény nem alkalmas.

#### **A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek**

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. Más gyógyszerrel egyidejűleg csak orvosi utasításra szedhető, mivel a gyógyszerek hatása módosulhat az együttes alkalmazás során.

#### **Terhesség és szoptatás**

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. A Rowatinex kapszula a terhesség első harmadában és szoptatás ideje alatt nem szedhető.

### **3. HOGYAN KELL SZEDNI A ROWATINEX KAPSZULÁT?**

A Rowatinex kapszulát mindig az orvos által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét. A készítmény szokásos adagja felnőtteknek naponta 3–4-szer 1, esetleg 2 kapszula az étkezés előtt fél órával.

## Ha az előírnál több Rowatinex kapszulát vett be

### A túladagolás tünetei:

Az illóolajok nagy adagban a központi idegrendszer működését gátolják, ami légzési elégtelenséghez, bódultsághoz, a görcs-készség fokozódásához vezethet. A gyomor ingerlésével émelygést, hányást, hasmenést idézhet elő.

### Mi a teendő a túladagolás esetén?

Gyomormosás, tüneti kezelés javasolt. A szív-, légzés-, vese- és májfunkció ellenőrzése ajánlott.

## Ha elfelejtette bevenni a Rowatinex kapszulát

Ne vegyen be dupla adagot az elfelejtett kapszula pótlására.

A következő adagot vegye be a megszokott időpontban.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

## 4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Rowatinex kapszula is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek. Nagyon ritkán átmeneti gyomorpanaszok, émelygés, ritkán hányás, gyomorégés jelentkezik. Esetenként kámför-szerű utóíz érzés tapasztalható.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

## 5. HOGYAN KELL A ROWATINEX KAPSZULÁT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő (hó, év, Exp. date) után ne szedje a Rowatinex kapszulát. A lejárati idő a megadott hónapon utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

## 6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

### **Mit tartalmaz a Rowatinex kapszula**

A készítmény hatóanyagai: 3 mg cineol, 4 mg fenkon, 4 mg anetol, 10 mg borneol, 15 mg camfén, 31 mg alfa és béta pinén, 33 mg olívaolajban kapszulánként.

Egyéb összetevők: etil-propil-parahidroxibenzoát nátrium só, Sunset Yellow (E110), Quinoline Yellow (E104), zselatin, glicerin.

### **Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás**

100 mg tiszta, fényes, színtelen, jellegzetes szagú és ízű folyadék sárga színű, gömb alakú, kb. 6.3 mm átmérőjű lágy zselatin kapszulában.

30 db kapszula buborékcsoomagolásban és faltartonban.

### **A forgalomba hozatali engedély jogosultja:**

Rowa Pharmaceuticals Ltd., Bantry, Írország

### **Gyártó:**

Rowa Pharmaceuticals Limited Bantry, Co. Cork, Írország

OGYI-T-4912/03

A betegtájékoztató OGYI-engedély száma: 25965/55/03.

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2007. november 5.