

Rowachol® kapszula

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi beteg-tájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a beteg-tájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.*
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.*

Milyen betegségek esetén használható és hogyan fejti ki hatását a Rowachol®?

A Rowachol® kapszula máj- és epebetegségek (pl. epekö, epegörcs, epehólyag- és epevezeték gyulladás, májgyulladás) kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény.

Milyen hatóanyagokat és segédanyagokat tartalmaz?

Hatóanyagok: 2,00 mg cineolum, 5,00 mg borneolum, 5,00 mg camphenium, 6,00 mg menthonum, 17,00 mg pinenum alpha+beta, 32,00 mg levomentholum kapszulánként.

Segédanyagok: olivaoaj, propil-parahidroxibenzoát-nátrium, etil-parahidroxibenzoát-nátrium, glicerin, zselatin, nátrium-réz-klorofill (E 141).

Milyen esetekben nem használható?

A készítmény összetevőivel szembeni túlérzékenység esetén.

Az epeutak elzáródása okozta sárgaság esetén, máj- és veseelégtelenségben.

Terhesség első harmadában.

Gyermekekben.

Miről kell feltétlenül tájékoztatnia a kezelőorvost a Rowachol® szedése előtt?

Ha a készítmény bármelyik összetevőjével szemben (különösen a mentol) túlérzékeny.

Szedhet-e egyéb gyógyszert a Rowachol®-al egyidőben?

Kerülendő a Rowachol® szedésével egyidejűleg véralvadásgátlók szedése; olyan gyógyszerek szedése, melyek a májban bomlanak le, valamint olyan készítmények alkalmazása, melyeknél az adag nagyon pontos beállítása szükséges.

A gyógyszer tartós szedése cukorbetegség szénhidrát-anyagcseréjét kedvezően befolyásolja, így – egyes esetekben – a cukorbetegség miatt szedett gyógyszerek adagjának csökkentése válhat szükségessé. Ezért cukorbetegségben a gyógyszer tartós használatáról tájékoztassák kezelőorvosukat.

Alkalmazható-e terhesség és szoptatás ideje alatt?

Bár magzatkárosító hatásról nem számoltak be, a **Rowachol**[®] adása a terhesség első harmadában nem javasolt. Szoptatás idején alkalmazása nem javasolt.

A terhesség második-harmadik harmadában kizárólag csak az orvos utasítására alkalmazható.

Hogyan kell használni a Rowachol[®]-t?

Ha az orvos másképp nem rendel, szokásos adagja felnőtteknek naponta 3-szor 1–2 kapszula, étkezés előtt fél órával.

A kezelés idején zsír- és koleszterinszegény étrendet tanácsos tartani.

Milyen nemkívánatos mellékhatások léphetnek fel a Rowachol[®] szedése közben?

Borsmenta vagy kámfor íz érzet, mely csökkenthető, ha étkezés előtt fél órával veszi be. Nagyon ritkán a szájban égető érzést okoz, vagy kisebbedés jelentkezik. Ritkán gyomorégés. A tünetek a gyógyszerzedés félbeszakításával azonnal rendeződnek.

Mi a teendő, ha elfelejti bevenni a Rowachol[®]-t?

A következő adagot vegye be a megszokott időpontban, ne vegyen be egyszerre két adagot.

Mire kell figyelemmel lennie túladagolás esetén?

A túladagolás tünetei: az illóolajok nagy adagban a központi idegrendszer működését gátolják, ami légzési elégtelenséghez, bódultsághoz vezethet, illetve fokozott izgalmi állapot, megnövekedett görcskészség jelentkezhet. A gyomor irritációja émelygést, hányást, hasmenést idézhet elő. Túladagolás esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Milyen kezelés szükséges túladagolás esetén?

Gyomormosás, tüneti kezelés javasolt. A szív-, légzés-, vese- és májfunkció ellenőrzése ajánlott.

Hogyan kell tárolni a Rowachol[®]-t?

Legfeljebb 25°C-on, fénytől és nedvességtől védve.

Csomagolás: 30 db, illetve 50 db kapszula.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül (hó, év, Ex Date) szabad felhasználni!

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A gyógyszert csak az eredeti dobozában szabad tárolni!

Ez az Ön gyógyszere! Másnak átadnia nem szabad, még akkor sem, ha hasonló tünetekről számol be valaki!

Forgalombahozatali engedély tulajdonosa: Rowa Pharmaceuticals, Írország

Gyártó: Rowa Pharmaceuticals, Írország

OGYI-T-6586/04-05

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 13 593/55/03

ROWA[®]

PHARMACEUTICALS LIMITED
Bantry, Co Cork, Ireland
Hungary L/2a 01-09