



BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Mucopront® kemény kapszula

(karbocisztein)

Mielőtt szedni kezdené gyógyszerét, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül.

Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen ennek a gyógyszernek a körültekintő, szakszerű alkalmazása.

○ Őrizze meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

○ További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.

○ Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a kemény kapszula?

A készítmény karbocisztein (375 mg/kapszula) hatóanyagot tartalmaz.

Segédanyagok: Magnézium-stearát, makrogol 10000, mikrokristályos cellulóz
Kapszulahéj: Indigókármin (E 132), sárga vas-oxid (E172), titán-dioxid (E 171), zselatin, tisztított víz.

Milyen betegségek kezelésére szolgál?

Nagy mennyiségű köpet termelődésével, elégtelen ürülésével járó légúti megbetegedésekben a nyák oldására, a köpetürítés elősegítésére szolgál.

Mikor nem alkalmazható a Mucopront kemény kapszula?

- Karbocisztein vagy a készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.
- Aktív gyomor- vagy nyombélfekély
- Terhesség és szoptatás ideje alatt
- 12 éves kor alatt.

Azon betegek, akiknek kórelőzményében asztma és/vagy fekélybetegség előfordult, csak egyedi orvosi megfontolás és ellenőrzés mellett alkalmazhatják.



Hogyan alkalmazza a Mucopront kemény kapszulát?

Ha az orvos másképp nem rendeli, szokásos adagja:

Felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek: naponta 3-szor 2 kapszula, amit kevés vízzel, szétrágás nélkül kell lenyelni.

A kezelés időtartama nem lehet hosszabb 10 napnál.

Kialakulhatnak-e mellékhatások az alkalmazás során?

A gyógyszer szedése alatt mellékhatásként előfordulhat gyomorégés, hányinger, hányás, hasmenés, túlérzékeny betegekben szájnyalvákártya gyulladás, nátha, valamint fejfájás. Egyes esetekben bőrkiütések vagy más allergiás reakciók felléphetnek, amelyekről csakúgy, mint más szokatlan tünetről a kezelőorvost értesíteni kell.

Alkalmazható-e más gyógyszerekkel egyidejűleg?

Köhögéscsillapítókkal együtt nem szabad szedni, mivel a köhögési reflex gátlása következtében veszélyes mértékű váladékfelhalmozódás alakulhat ki. Egyéb gyógyszerekkel egyidejűleg alkalmazni csak az orvos tudtával szabad, mivel az együttes alkalmazás során módosulhat a gyógyszerek hatása.

Hatása a gépjárművezetéshez szükséges képességekre:

A Mucopront adásakor ilyen hatásokat nem észleltek.

Mire kell figyelni a Mucopront kemény kapszula alkalmazása során?

A keletkezett váladékot fel kell köhögni és kiköpni, így a váladék tüdőben való felgyülemlése elkerülhető.

Hogyan kell a kemény kapszulát tárolni?

Legfeljebb 25°C-on, nedvességtől védve tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Actavis Hungary Kft., 4032 Debrecen, Bartha B. u. 7.

OGYI-T-1380/01 (20 db)

OGYI-T-1380/02 (50 db)

Betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2008. május 27.