

Zymafluor®

¼ mg

bukkális tabletta

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása. Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.

A betegtájékoztató tartalma

Milyen betegségek esetén alkalmazható?

Tudnivalók a Zymafluor tablettára

alkalmazása előtt...

Hogyan kell szedni a Zymafluor tablettát?

Lehetséges mellékhatások

A készítmény tárolása

Hatóanyag 0,25 mg fluoriddal egyenértékű 0,553 mg nátrium-fluorid tablettánként.

Segédanyagok: vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, borsosmenta olaj, szorbit.

A forgalomba hozatali engedély

jogosultja: Novartis Hungária Kft.

1114 Budapest, Bartók Béla út 43–47.

(Consumer Health részlege)

Gyártó: Famar Italy, Baranzate di Bollate, Olaszország

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Zymafluor tabletta a fogszuvasodás megelőzésére alkalmazható. A Zymafluor tabletta biztosítja gyermeke fogai számára a fluoridot, amely azokat ellenállóvá teszi a fogszuvasodással szemben. A fluoridpótlás a fogátörés előtt el kell, hogy kezdődjön és ajánlatos tartósan folytatni.

2. Tudnivalók a Zymafluor tablettára alkalmazása előtt...

Ne kapjon gyermeke Zymafluor tablettát, ha túlérzékeny a Zymafluor tabletta hatóanyagára vagy bármely segédanyagára, jelentős vesekárosodás esetén valamint, ha az ivóvíz fluorid tartalma meghaladja a 0,7 mg/litert.

Terhesség, szoptatás

Terhességben és szoptatás idején napi 1 mg fluorid használatos széleskörben és hosszú évek óta anélkül, hogy a kezelés káros következményét észlelték volna. Mivel az anyatejbe csak elhanyagolható mértékben jut át, így a szoptatott csecsemőnek is ajánlott, gondosan összetörve napi 1 db ¼ mg-os Zymafluor tablettát adni. Kérdéseivel a gyógyszer szedése előtt forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

Egyéb gyógyszerek alkalmazása:

Alumínium, kalcium vagy magnézium-sókat tartalmazó gyógyszer bevétele után a Zymafluor tabletta beadásával két órát kell várni. Amennyiben a gyermek óvodában vagy iskolában rendszeresen kap fluorid tartalmú tablettát (pl. Dentocar), a Zymafluor tablettát csak a hétvégén, illetve a szünetek idején kaphatja.

Ételek és italok szerepe:

Tejjel vagy tejtermékkel a Zymafluor tablettát egyidőben ne vegye be.

3. Hogyan kell szedni a Zymafluor tablettát?

Legyen körültekintő a Zymafluor tabletta alkalmazásakor!

A gyermekének javasolható napi Zymafluor mennyiség az ivóvíz*, a konyhasó** és a fogkrém** fluoridtartalmától, továbbá a gyermek életkorától függ.

*Az ásványvíz fluoridtartalma mindig szerepel az ásványvíz címkéjén. A lakosság által fogyasztott ivóvíz fluoridtartalmáról az adott közigazgatási terület illetékes Állami és Népegészségügyi Tisztviselői Szolgálat (ÁNTSZ) ad felvilágosítást.

**Kérjük minden esetben ellenőrizze a fluoridtartalmat. (konyhasó, fogkrém).

Az ivóvíz fluorid tartalma (mg/l)	< 0,3	0,3 – 0,7	> 0,7
Az ajánlott fluorid pótlás: A fluorid pótlás javasolt napi mennyisége (mg)			
Életkor			
Kéthetes kortól kétévesig	0,25	0	0
2–4 éves kor között	2 x 0,25	0,25	0
4–16 éves kor között	4 x 0,25	2 x 0,25	0
Terhességben	4 x 0,25	2 x 0,25	0

A fluorid pótlás előtt kérdezze meg a gyermek kezelőorvosát, fogorvosát vagy a gyógyszerészt a helyes adagolás érdekében. A táblázat segítségével, illetve orvosa, gyógyszerész javaslatára megválasztott napi Zymafluor mennyiséget többnyire célszerű egyetlen adagban beadnia a gyermeknek.

Kisgyermekeknek a Zymafluor tabletta csak összetörve adható be! Az összetört tablettát akár egy pohár vagy bögre vagy egy cumisüveg folyadékban **(de nem tejben)** főloldva, akár szilárd ételhez keverve beadható.

Amint a gyermek elég érett ahhoz, hogy a tablettát ne nyelje le, a tablettát egészben is alkalmazható. A gyógyszert a szájban a fogorvos külső oldalán a fogíny mellett, felváltva hol a bal, hol a jobb oldalon kell elszopogatni. Legalkalmasabb este, fogmosás után és lefekvés előtt beadnia gyermekének a Zymafluor tablettát.

Információ a flakon kinyitásához



1. Húzza ki a flakon tetején található nyelvet a nyíl irányába.
2. Nyomja felfelé a nyelvet amíg a tető kinyílik.

Ha elfelejtette beadni a Zymafluor tablettát...

Ha elfelejtette gyermekének beadni a napi adagot, másnap ne alkalmazzon dupla adagot a kimaradt adag pótlására, hanem folytassa a gyógyszer adagolását az előírtak szerint, a legközelebbi esedékes időpontban.

Ha az előírtnál több Zymafluor tablettát adott be gyermekének

Azonnal értesítse az orvost vagy a gyógyszerészt, ha túladagolás gyanúja merül fel.

Mit jelent a véletlenszerű nagyobb mennyiségű tablettát bevétele és mi a teendő?
Ilyenkor azonnal forduljon kezelőorvosához

vagy az orvosi ügyelethez. Ha egy 10 kg testtömegű gyermek 100–200 darab Zymafluor ¼ mg-os tablettát nyelt le, hánytassa meg a gyermeket és itasson vele nagyobb mennyiségben tejet.

Ha egy 10 kg testtömegű gyermek 200 szeménél többet nyelt le a Zymafluor ¼ mg-os tablettából, akkor késedelem nélkül kórházba kell szállítani.

A túladagolás tünetei a következők: nyáladzás, émelygés és hányás, hasi fájdalom és hasmenés.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszernek, a Zymafluor tablettának is lehetnek mellékhatásai. Az ajánlott adagban alkalmazva a fluorid érdemi mellékhatást nem okoz. Ritkán enyhe kiütésről számoltak már be. A kezelés abbahagyásával gyorsan elmúlik. Igen nagy fluorid adagok bevétele – pl. napi 2 mg fluorid bevitel éveken keresztül, ami a fogzománc meszesedéséhez szükséges 16 év alatt – az áttörő fogak zománcának foltos elszíneződését okozhatja. Ha az itt felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb szokatlan tünetet észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. A készítmény tárolása

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó. Legfeljebb 25 °C-on, az eredeti csomagolásban tárolandó.

A nedvességtől történő védelem érdekében a tubust szorosan zárva kell tartani.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

OGYI-T-4676/01 (100x) Zymafluor

¼ mg-os bukkális tablettát

OGYI-T-4676/02 (400x) Zymafluor

¼ mg-os bukkális tablettát

*Betegtájékoztató engedélyezésének dátuma:
2007.06.19*

 NOVARTIS

MA 250607
M1 210704 O

HU 898580 – 24365 C1-D