

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

METEOSPASMYL kapszula
alverine citrate + simeticone

Mielőtt elkezdéné gyógyszerét szedni, alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható.

Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.

Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható a Meteospasmyl kapszula
2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a kapszulát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás
6. További információk

1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ A METEOSPASMYL KAPSZULA

Haspuffadással járó fájdalmas emésztés esetén tüneti kezelésre felnőtteknek.

A Meteospasmyl kapszula görcsoldó hatású és csökkenti a belek gáztartalmát.

Vény nélkül is beszerezhető, de felhasználásához az orvos véleményét célszerű kikérni.

2. TUDNIVALÓK A KÉSZÍTMÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a készítményt:

- ha túlérzékeny a készítmény hatóanyagára vagy bármely segédanyagára,
- bélelzáródás esetén.

Terhesség, szoptatás

A készítmény terhesség vagy szoptatás alatti szedése nem javasolt.

Ha Ön a kezelés alatt teherbe esik, feltétlen kérje ki orvosa tanácsát, mivel a további kezelés szükségességének eldöntésére orvosa jogosult.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek:

Egyéb gyógyszer egyidejű alkalmazását az orvossal meg kell beszélni.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A KAPSZULÁT?

Szokásos adagja felnőtteknek naponta 2-3-szor 1 kapszula az étkezés kezdetén.

Ha panaszai tartósan fennállnak, kezelőorvosát fel kell keresni, mert a panaszok okát ki kell vizsgálni.

Ha az előírtnál több kapszulát vett be:

Értesítse kezelőorvosát vagy keresse fel a legközelebbi kórház sürgősségi osztályát.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a Meteospasmyl kapszulának is lehetnek mellékhatásai.

Allergiás tünetek vagy bármilyen más szokatlan tünet jelentkezésekor azonnal forduljon kezelőorvosához.

A készítmény alkalmazása során ritka esetben csalánkiütés jelentkezhet, esetenként gégeödémával és sokkal.

Májelváltozások alakulhatnak ki, melyek a kezelés abbahagyását követően normalizálódnak.

Mellékhatások jelentkezéséről, ill. egyéb nem várt tünet észleléséről tájékoztassa kezelőorvosát.

5. TÁROLÁS

Különleges tárolást nem igényel.

A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Hatóanyag: 60,0 mg alverin-citrát és 300 mg szimetikon kapszulánként.

Segédanyagok: kapszulahéj:titán-dioxid (E 171), glicerin, zselatin,

telített, közepes láncosságú trigliceridek, szójalecitin

Leírás: Opálos, homogén, szürkésfehér színű, szagtalan szuszpenzió amely 6-os méretű, hosszúkás, fehér, átlátszatlan, lágyszelatin kapszulába van töltve.

Csomagolás: 10 db ill. 20 db kapszula PVC//Al buborékfóliában, dobozban.

A forgalombahozatali engedély jogosultja: TEVA Magyarország Zrt.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Gyártó: Mayoly Spindler, Chatou Cedex, Franciaország

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez:

TEVA Magyarország Zrt.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

OGYI-T-4539/01 (20 db)

OGYI-T-4539/02 (10 db)