



Kaldyum® 600 mg

retard kapszula

Betegájékoztató

Mielőtt elkezdene szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

- *Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.*
- *Ezt a gyógyszert az orvos személyesen Önnek írta fel. A készítményt másoknak átadni nem szabad, mert számukra ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tüneteik az Önéhez hasonlóak.*

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Kaldyum 600 mg retard kapszula és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Kaldyum 600 mg retard kapszula alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Kaldyum 600 mg retard kapszulát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Hatóanyag: 600 mg kálium-klorid retard kapszulánként.

Segédanyagok: Mag: indigókármín (E132), vízmentes kolloid szilícium-dioxid, talkum, dimetikon, 30%-os poliakrilát-diszperzió, mikrokristályos cellulóz.

Kapszulahéj:

Felső rész: eritrozín (E127), indigókármín (E132), zselatin.

Alsó rész: zselatin.

Leírás: Retard kapszula: felső részén kék színű, alsó részén szintelen, átlátszó „OEL” méretű kemény zselatin kapszulába töltött, fehér vagy sárgásfehér és kék színű szagtalan pelletek. Csomagolás: 50 db, 100 db kapszula PE garanciazáras kupakkal lezárt átlátszó üvegben, dobozban.

Gyártó és forgalomba hozatali engedély jogosultja:

EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYRT.

MAGYARORSZÁG

H-1106 BUDAPEST, Keresztúri út 30-38.



1. Milyen típusú gyógyszer a Kaldyum 600 mg retard kapszula és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A készítmény hatóanyaga a kálium-klorid, az alapvető élettani folyamatokhoz nélkülözhetetlen kálium ion sósavas sója. A kálium

specifikus élettani hatásokkal rendelkező ion, a test legtöbb szövetének a legfontosabb sejten belüli kationja. A kálium ionok számos alapvető élettani folyamatban vesznek részt, beleértve a sejten belüli tónus fenntartását, az idegimpulzus vezetést, a szív-, a vázizomzat és a szimaizom összehúzódását és a normális vesefunkció fenntartását.

A kálium legnagyobb része az étkezéssel kerül a szervezetbe. Gyógyszerként a kálium sóit a káliumhiányos állapotok kezelésére, vagy ezek megelőzésére alkalmazzák.

2. Tudnivalók a Kaldyum 600 mg retard kapszula alkalmazása előtt

Nem alkalmazható a Kaldyum 600 mg retard kapszula:

Ha magas szérum káliumszintet észlelnek, heveny és időlt veseelégtelenség bizonyos stádiumaiban, mellékvesekéreg elégtelenségben (Addison-kórban), akut kiszáradás esetén; szervi, illetve funkcionális okok miatt lassult gyomor-bél működésben.

Fokozott óvatossággal alkalmazható a Kaldyum 600 mg retard kapszula:

A kórtörténetben szereplő vagy aktuálisan fennálló gyomor- vagy nyombélfekély esetén fokozott óvatosság szükséges.

Fokozott elővigyázatosság szükséges digitális egyidejű szedése esetén a káliumpótlás hirtelen elhagyásakor, mivel az így kialakuló alacsony szérum káliumszint a digitális mérgezés kialakulásának veszélyét növeli.

Kaldyum 600 mg retard kapszula együttes alkalmazása étellel/itallal:

A gyógyszert étkezés közben, vagy után szétrágás nélkül, bőséges folyadékkal kell bevenni. Kettőnél több kapszula alkalmazása esetén a napi adagot két vagy több részre kell osztani.

Terhesség és szoptatás:

Nem történtek kontrollált klinikai vizsgálatok terheseken, de a tapasztalatok alapján az előny/kockázat szigorú mérlegelésével a terhességben is szedhető.

A káliumpótlásnak általában nincs, vagy kicsi a hatása az anyatej kálium tartalmára. Nincs arra adat, hogy az anyának szájon át adagolt kálium bármilyen ártalmas hatást okozna az anyatejfel táplált csecsemőkn.



A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

Nincs arra adat, hogy a kálium készítményeknek hatása lenne a gépjárművezetéshez vagy a gépkezeléshez szükséges képességekre.

Egyéb gyógyszerek alkalmazása (gyógyszerkölsönhatás):

A vérnyomáscsökkentő ACE-gátlók (pl. kaptopril, enalapril) szérum káliumszint emelkedést okozhatnak. ACE-gátlókat szedő betegeknél káliumpótlást csak szoros ellenőrzés mellett lehet alkalmazni.

Káliumsók és káliummegkötő vízhatók egyidejű alkalmazása súlyos káliumszint emelkedést okozhat.

Nemszteroid gyulladáscsökkentőkkel, antikolinerg hatású gyógyszerekkel együtt adva fokozódhatnak a gyomor-bélrendszeri mellékhatások.

Digitálisz glikozidokkal, β -blokkolókkal, heparinnal, ciklosporinnal együtt adva a szérum káliumszint rendszeres ellenőrzése szükséges.

Vesekárosító anyagokkal (ciszpaltin, aminoglikozidok) együtt adva a káliumszint nő.

A kölsönhatások az elmúlt időszakban, illetve a közeljövőben szedendő gyógyszerekre is vonatkozhatnak. Ezért a jelenleg vagy a közelmúltban szedett receptköteles vagy recept nélküli kiváltható gyógyszerreiről tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét!

3. Hogyan kell alkalmazni a Kaldyum 600 mg retard kapszulát?

Orvosa tájékoztatja Önt a gyógyszer alkalmazásának módjáról. Gyógyszerét kizárólag az orvos által előírt adagban és ideig alkalmazza.

Az adagolást az egyéni szükségletek szerint kell beállítani; általában felnőtteknél a *káliumhiány megelőzésére* 2-3 kapszula/nap, a *káliumhiány kezelésére* 5-12 kapszula/nap szükséges, a szérum káliumszint rendszeres ellenőrzése mellett.

A kezelés során – különösen szív- és vesebetegség esetén –, a szérum káliumszint rendszeres ellenőrzése mellett időnkénti EKG kontrollt javasolt.

Időseknek, máj- és vesebetegség esetén:

Időskorban vagy elégtelen veseműködés esetén az adag csökkentése lehet szükséges; ezen esetekben kiemelten fontos az szérum káliumszint rendszeres ellenőrzése.

Ha az előírtnál több gyógyszert vett be:

Túladagolás esetén a lehetséges mellékhatások mellett a magas szérum káliumszint tünetei fordulhatnak elő a mérgezés súlyosságától függően: érzékszavar, izomgyengeség, bñulás,

véryomáseés, sokkos állapot, szívritmuszavarok, szívmegállás. Az emelkedett szérum káliumszint az EKG vizsgálat alapján egyszerűen kimutatható.

Ha a gyógyszerből jóval többet vett be az előírtnál, haladéktalanul értesítse kezelőorvosát, mert a túladagolás kezelése összetett, azt minél hamarabb el kell kezdeni és gyógyintézetí (esetleg intenzív) ellátásra is szükség lehet.

Magas szérum káliumszint előfordulhat káliummegkötő vízhatók alkalmazása esetén is, valamint mellékvesekéreg elégtelenségben, veseelégtelenségben, anyagcsere zavarokban, szöveti trauma (nagy testfelületre kiterjedő égés) után.

Ha gyógyszerét elfelejtette bevenni:

Ha gyógyszerét elfelejtette bevenni, mielőbb pótolja a kimaradt adagot. Ha már a következő bevétel esedékes, ne vegyen be dupla adagot, mert ezzel már nem pótolhatja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének teszi ki magát.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszernek, a Kaldyum 600 mg retard kapszulának is lehetnek mellékhatásai.

Ritkán hányinger, hányás, hasmenés, haspuffadás, hasi görcsök előfordulhatnak a káliumsók bevétele után. Ezek a tünetek a bélcsatorna irritációjának a következményei; leginkább egyidejű étkezéssel és a gyógyszer több részletben történő bevitelével csökkenthetők.

Egyes esetekben az emésztőcsatornában vérzés, fekély, bélátfúródás és szűkület előfordulhat a lassú hatóanyagleadású kálium-klorid készítmények alkalmazása után is.

Amennyiben szapora szívdobogás, izomgyengeség, ismétlődő hányás vagy hasmenés, szuoksztűnő vagy véres széklet jelentkezik, a gyógyszer szedését azonnal fel kell függeszteni és orvoshoz kell fordulni.

A fentiekben nem említett mellékhatás jelentkezéséről is értesítse orvosát, gyógyszerészét!

5. Tárolás

30 °C alatt tárolandó.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

OGYI-T-5297/01 (50 x)
OGYI-T-5297/02 (100 x)

Beteg tájékoztató OGYI eng.száma: 30 589/55/2003

EGIS dok. szám: 15922