

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót!

- Ez a gyógyszer orvosi vény/rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez!
- Keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak! Lehet, hogy másféle kezelésre van szüksége.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejti ki hatását a Diclac 5% gél?
2. Tudnivalók a Diclac 5% gél alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Diclac 5% gél?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Mit tartalmaz a Diclac 5% gél?

Hatóanyag:

50,0 mg diklofenak-nátrium grammonként.

Segédanyagok:

„Parfüm Bouquet” WN 4507, hipromellóz, makrogol-glicerín-éter-kókuszsav-észterek, tisztított víz, izopropil-alkohol.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Sandoz Hungária Kft.

1034 Budapest, Tímár u. 20.

1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ ÉS HOGYAN FEJTI KI HATÁSÁT A DICLAC 5% GÉLT?

Egyes mozgásszervi betegségek (reumás eredetű elváltozások, izom-, szalag-, és ínsérülések) kezelésére, felületes vénagyulladás külsőleges, kiegészítő kezelésére szolgáló fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő készítmény.

2. TUDNIVALÓK A DICLAC 5% GÉL ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne használja a Diclac 5% gél:

- A készítmény iránti, továbbá acetilszalicilsav vagy egyéb nem szteroid gyulladáscsökkentő iránti túlérzékenység esetén.
- 6 éves kor alatti gyermekeknél nem használható.
- Terhesség és szoptatás időszakában nem alkalmazható.

Terhesség, szoptatás

A hatóanyag bórról való esetleges felszívódása miatt terhesség és szoptatás időszakában alkalmazása nem javallt.

Terhesség, ill. szoptatás esetén a gél alkalmazása előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét!

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

A Diclac 5% gél külsőleges alkalmazású készítmény, eddig nem ismert, hogy negatívan befolyásolná a közlekedésben való részvételt, ill. a gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek:

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is!

A Diclac 5% gél külsőleges alkalmazású készítmény, nem valószínű, hogy negatívan befolyásolná más, egyidejűleg szedett gyógyszer hatását.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A DICLAC 5% GÉLT?

Ha az orvos másképpen nem rendeli, a gélt naponta 2-3 alkalommal a fájdalmas területre vékonyan kell felvinni.

Kizárólag ép bőrfelületre alkalmazható.

A készítmény alkoholt (2-propanol) is tartalmaz, ezért nyílt sebbel, nyálkahártyával vagy a szemmel ne érintkezzen.

Ha az előírtnál több Diclac 5% gél használát:

A Diclac 5% gél külsőleges alkalmazású készítmény, nem valószínű, hogy az előírtnál több gél felvitele túladagolást okozna.

Ha elfelejtette a gélt alkalmazni:

Kenje be a fájdalmas testrész, mielőtt észbe jut! A készítmény hatás szempontjából fontos a rendszeres kezelés. Ezért pontosan kövesse az adagolási útmutatót, vagy kezelőorvosa utasítását.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mellékhatásként bőrtünetek jelentkezhetnek, mint bőrvörösség, viszketés, kiütés.

Ha az itt felsorolt nemkívánatos hatásokon kívül egyéb szokatlan tünetet észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét!

5. TÁROLÁS

Legfeljebb 25°C-on tárolandó!

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

Csomagolás:

50 g vagy 100 g gél fehér PE vagy PP kupakkal lezárta, védőbevonattal ellátott alumínium tubusba töltve.

1 tubus 1 dobozban.

OGYI-T-4000/01

OGYI-T-4000/02

Diclac 5% gél 50 g

Diclac 5% gél 100 g

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2007. április 16.