

# Telviran® 5% krém

Mielőtt elkezdéné gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.

## 1. A készítmény neve és javallatai

### Telviran® 5% krém

#### Összetétele

**Hatóanyag:** 50,0 mg aciclovirum 1 g krémben.

**Segédanyagok:** dimetikon, cetil-alkohol, folyékony paraffin, glicerimonosztearát és makrogol-sztearát keveréke (Arlatone 983. S.I.C.I.), fehér vazelin, propilén-glikol, tisztított víz.

**Leírás:** Fehér, vagy csaknem fehér színű, jellegzetes illatú, homogén krém.

**Csomagolás:** 1 db 2 g, ill. 10 g töltetű, csavarmentes, műanyag kupakkal lezárt alumíniumtubus, faltkartonban.

## 2. Javallatok

A Telviran krém herpeszvírus okozta bőrfertőzések helyi kezelésére szolgáló gyógyszer.

### Forgalombahozatali engedély jogosultja

EGIS Gyógyszergyár Rt.

H-1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

### Ne alkalmazza a Telvirant:

- ha a készítmény hatóanyagával, vagy propilén-glikollal szemben túlérzékeny.
- szembe, a szem környékére, illetve nyálkahártyákon.

### Figyelmeztetés:

Övsömör, súlyos herpeszvírus fertőzés esetén, valamint immunkárosodásban szenvedő betegek herpeszvírus fertőzéseinek kezelésére aciklovir hatóanyagú tabletták szedése javasolt. Ha a fenti állapotok gyanúja merül fel, vagy tudomása van immunkárosodásról, forduljon orvosához.





### ***Terhesség, szoptatás***

Megfelelő tapasztalat hiányában terhesség és szoptatás alatt csak az orvos kifejezett utasítására alkalmazható.

Terhesség, szoptatás esetén bármely gyógyszer alkalmazása előtt forduljon orvosához, gyógyszerészéhez.

### ***Járművezető képesség és balesetveszéllyel járó munkavégzés***

A Telviran krém helyi alkalmazásakor gyakorlatilag nem jut be a keringésbe, ezért nem várható, hogy befolyásolja a gépjárművezetéshez, vagy balesetveszélyes munka végzéséhez szükséges képességeket.

### ***Gyógyszerkölcsönhatások***

A Telviran helyi alkalmazása mellett a szájon át szedett gyógyszerekkel kölcsönhatások nem ismeretesek.

### **3. Alkalmazás**

A kezelést mind az először jelentkező, mind a kiújuló herpesz fertőzés első jeleinek, illetve tüneteinek (fájdalom, bizsergés, kipirosodás) megjelenésekor a lehető leghamarabb el kell kezdeni. Ha az orvos másképp nem rendel, naponta 5 alkalommal (napközben 4 óránként) kell az érintett bőrfelületet bekenni. A kezelést általában 5 napig, szükség esetén 10 napig, a seb gyógyulásáig kell folytatni.

Amennyiben a javasolt kezelési idő alatt nem enyhülnek, netán fokozódnak panaszai, forduljon orvosához!

A krém vízzel könnyen lemosható, nem színezi a fehérneműt.

### **4. Lehetséges mellékhatások**

A Telviran krém használatakor átmeneti égő, csípő érzés, ritkán helyi bőrkkiütés, viszketés, enyhe bőrszárazság és hámlás, bőrgyulladás fordulhat elő.

Ha a felsorolt tünetek valamelyikét észleli, hagyja abba a kenőcs használatát, és forduljon orvosához.

Ha bármilyen, a fentiekben nem említett mellékhatást észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

### **5. Tárolás**

Szobahőmérsékleten, 25 °C alatt tartandó.

### **A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!**

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A Betegtájékoztató OGYI eng. szám: 17 571/55/02.

EGIS dok. szám: 8678



EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.  
BUDAPEST