

Betegájékoztató

▶ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Mundisal[®] gél



▶ A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejt ki hatását a Mundisal[®]gél?
2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a gélt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

▶ Hatóanyag:

87,1 mg cholini salicylas (kolin-szalicilát).

▶ Segédanyagok:

catalkónium-klorid, áizsolaaj, mentol, nátrium-ciklamát, hipromellóz, glicerin, 96%-os etanol, tisztított víz

▶ A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Mundipharma Ges.m.b.H., A-1072 Bécs, Apollgasse 16-18., Ausztria

▶ 1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ A MUNDISAL[®] GÉL?

Száj-, orr- és garatnyálkahártya felületeinek kisebesedése, vagy kifehélyesedése következtében kialakuló fájdalom és gyulladás kezelésére

▶ 2. TUDNIVALÓK A KÉSZÍTMÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a készítményt:

-ha túlérzékeny a készítmény hatóanyagára vagy bármely segédanyagára.

Terhesség, szoptatás

A szalicilát származékok a méhlepényen átjutnak, ezért a gyógyszert nem szabad alkalmazni a terhesség utolsó három hónapjában.

A terhesség első kétharmadában, valamint szoptatás ideje alatt mivel a szalicilátok minimális mértékben megjelennek az anyatejben, a megadott adagolást nem szabad túllépni.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Fenti képességeket a készítmény nem befolyásolja.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek:

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

A kolin-szalicilát fokozhatja az egyidejűleg szedett kumarin származékok (véralvadásgátlók) hatását.

▶ 3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A GÉLT?

Kb. 1 cm géل csíkot kell a fájdalmas területre felvinni, naponta 3-4-szer előnyösen lefekvés előtt is.

Szükség esetén a gélt enyhén, a fájdalmas területre be kell masszírozni.

Szájnyálkahártya kezelése esetén a kezelést étkezés után kell elvégezni.

A kezelést mindig tiszta újjal kell a kezelendő felületen elvégezni.

Ha a géл alkalmazása során hatását túlzottan erősnek érzi, vagy a készítmény csekély hatásának bizonyul, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

Ha az előírtnál több gélt alkalmazott:

Véletlenül jelentős mennyiségű géл felszívódása esetén fordulhat elő túladagolás, ami erős égő érzést, hányingert, hányást, fülzúgást, zavartságot okozhat.

Nagyon nagy dózis esetén szisztémás szalicilát túladagolási jelenségek léphetnek fel.

Túladagolás esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Ilyen esetben hánytatást, gyomormosást, hashajtást kell alkalmazni.

Ha adagját elfelejtette alkalmazni:

Az elmaradt kezelés bármikor folytatható.

▶ 4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a Mundisal gélnak is lehetnek mellékhatásai.

Acut nyálkahártya sérülés területén alkalmazva átmeneti enyhe, égő érzés keletkezhet.

Ha az itt felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb szokatlan tünetet észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

▶ 5. TÁROLÁS

Száraz helyen, legfeljebb 25°C-on tartandó.

A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T-6708/01

Betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2007. december 3.