

# OTIPAX®

**Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.**

**Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.**

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 10 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer az Otipax fülcsepp és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Otipax fülcsepp alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az Otipax fülcseppet?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

## OTIPAX fülcsepp

**A készítmény hatóanyaga 100 g fülcseppben:**

Fenazon	4,00 g
Lidokain-hidroklorid	1,00 g

Segédanyagok: nátrium-tioszulfát, tisztított víz, alkohol, glicerin.

**A forgalomba hozatali engedély jogosultja**

Laboratoires Biocodex, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Franciaország

### 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER AZ OTIPAX FÜLCSEPP ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatású fülcsepp.

Kizárólag külsőleg használható!

Bizonyos fajta fülgyulladások okozta fájdalom helyi kezelésére, ép dobhártya mellett:

- pangásos heveny középfülgyulladás,
- vírusos influenza okozta fülgyulladás esetén,
- légnyomásbántalom okozta fülgyulladás.

### 2. TUDNIVALÓK AZ OTIPAX FÜLCSEPP ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza az Otipax fülcseppet ha:

- ha a dobhártya átfürödött,
- ha Ön a gyógyszer bármelyik összetevőjére túlérzékeny (elsősorban lidokain).

**KÉTSÉG ESETÉN FELTÉTLENÜL KÉRJEN TANÁCSOT KEZELŐORVOSÁTÓL VAGY GYÓGYSZERÉSZÉTŐL.**

**Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható:**

Ha a dobhártya lyukas, akkor ez a gyógyszer a középfülben nemkívánatos hatásokat okozhat.

ÓVINTÉZKEDÉSKÉNT forduljon orvoshoz, hogy ellenőrizze a dobhártya épségét, mielőtt elkezdené használni ezt a gyógyszert.

A kezelés időtartama ne legyen hosszabb 10 napnál. Ha a tünetek nem szűnnek meg, FORDULJON KEZELŐORVOSÁHOZ.

**KÉTSÉG ESETÉN FELTÉTLENÜL KÉRJEN TANÁCSOT KEZELŐORVOSÁTÓL VAGY GYÓGYSZERÉSZÉTŐL.**



### Egyéb gyógyszerek alkalmazása:

Az esetleges gyógyszerkölcsonhatások elkerülése érdekében mindig közölni kell kezelőorvosával vagy gyógyszerészével, ha bármilyen más kezelésben részesül.

### Terhesség, szoptatás:

Ezt a gyógyszert szükség esetén terhesek és szoptató anyák is alkalmazhatják a szokásos módon.

Általános alapelv: ha Ön terhes vagy szoptat, mindig kérjen tanácsot kezelőorvosától vagy gyógyszerészétől, mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene használni.

### A készítmény hatásai gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre:

Nem befolyásolja hátrányosan az ezekhez szükséges képességeket.

### Sportolók:

A sportolók figyelmét felhívjuk arra, hogy ez a gyógyszer olyan hatóanyagot tartalmaz, amely pozitív eredményt adhat a tiltott gyógyszerhasználat kimutatására végzett tesztekben.

## 3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ OTIPAX FÜLCSEPPET?

- Használat előtt a tartályt kézbe fogva melegítsük, hogy a hideg oldat ne érintkezzen a füllel.

- Cseppentő üveg: a cseppentő feltét puha részének óvatos összenyomásával cseppentsünk 4 cseppet a fájós fül hallójáratába naponta kétszer vagy háromszor.

Kizárólag külsőleg használható. Fülészeti alkalmazásra.

Hogyan kell használni a cseppentős üveget?

- Csavarja le az üveg kupakját.
- Csavarja rá a cseppentőt az üvegre.
- Vegye le a cseppentő kupakját.
- Fordítsa fejjel lefelé az üveget, majd óvatosan nyomja össze a cseppentőt és cseppentsen ki 1 cseppet.
- Nyomja tovább, amíg 4 cseppet ki nem cseppentett.
- Végül csavarja vissza a fehér kupakot.

A kezelés időtartama ne legyen hosszabb 10 napnál. Ha a tünetek nem szűnnek meg, FORDULJON KEZELŐORVOSÁHOZ.

## 4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, az OTIPAX fülcseppnek is lehetnek mellékhatásai. Helyi reakciók kockázata a hallójárat allergiája, ingerlés vagy kivörösödése formájában. Kétség esetén feltétlenül forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez, és közölni velük minden más olyan nemkívánatos és kellemetlen hatást is, amely ebben a betegtájékoztatóban nem szerepel.

## 5. TÁROLÁS

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl nem szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekek elől elzárva tartandó.

OGYI-T-6180/01

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2008. január 23.

39940/02