

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejti ki hatását a GUTTALAX cseppek?
2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a cseppeket?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Guttalax®

cseppek



Boehringer
Ingelheim

Hatóanyag:

7,50 mg nátrium-pikoszulfát. milliliterenként.

Segédanyagok: citromsav-monohidrát, trinátrium-citrát, nátrium-benzoát, szorbit-oldat 70%, tisztított víz.

Leírás: tiszta, színtelen vagy sárgás vagy sárgás-barna színű, kissé viszkózus oldat.

Csomagolás: 15 ml, ill. 30 ml oldat zöld színű csavarmentes PP kupakkal és PE cseppentőfeltéttel lezárt, fehér színű, III-as típusú üvegbe töltve.
Egy üveg dobozban.

A forgalombahozatali engedély jogosultja:

Boehringer Ingelheim International GmbH
Ingelheim am Rhein, Németország

Gyártó:

Instituto de Angeli S.r.l. Olaszország

1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ ÉS HOGYAN FEJTI KI HATÁSÁT A GUTTALAX CSEPPEK?

A GUTTALAX csepp hatóanyaga, a nátrium-pikoszulfát helyileg ható, triarilmetán típusú hashajtó. A vastagbél baktériumai hasítással aktiválják, ezt követően a nyálkahártya ingerlésével serkenti a vastagbél működését. A hashajtó hatás kialakulásához szükséges idő 6–12 óra.

2. TUDNIVALÓK A KÉSZÍTMÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a készítményt:

- ha túlérzékeny a készítmény hatóanyagára vagy bármely segédanyagára,
- bélelzáródásban,
- heveny hasi kórképben (pl. heveny féregnyúlványlob),
- heveny gyulladásos bélbetegségben,
- nagyfokú kiszáradásban.

Kizárólag orvosi javallatra adható:

- gyermekkorban

Terhesség, szoptatás

A készítmény hosszú múltra visszatekintő alkalmazása során nem észlelték, hogy a terhesség ideje alatt kedvezőtlen vagy ártalmas mellékhatásokat okozna. A terhesség ideje alatt azonban csak orvosi javaslatra szabad bármilyen gyógyszert bevenni – ez alól a GUTTALAX sem kivétel. Bár nincs bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a GUTTALAX kiválasztódna az anyatejbe, a készítmény alkalmazásának ideje alatt ajánlott mellőzni a szoptatást.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre
Nem valószínű, hogy a GUTTALAX cseppek hatással lenne az Ön járművezetői vagy egyéb gépkezelői képességeire.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb

gyógyszerek:

Nagy adag GUTTALAX csepp szedése esetén helyénvaló bizonyos elővigyázatosság, ha Ön egyidejűleg vizelethajtót vagy mellékvesehormont tartalmazó gyógyszereket szed, mert ezek fokozhatják az elektrolit-egyensúly felborulásának kockázatát. Az elektrolit-háztartás egyensúlyzavara esetén fokozódhat a szívglükózidok toxicitása. Az egyidejűleg adott széles spektrumú antibiotikumok gyengíthetik a GUTTALAX hashajtó hatását.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A CSEPPEKET?

Ha az orvos másképp nem rendel, a GUTTALAX cseppek javasolt adagolása a következő: Az oldat 7,5 mg hatóanyagot tartalmaz milliliterenként (=15 cseppben).

Felnőttek és 10 évesnél idősebb gyermekek:

10–20 csepp (5–10 mg)

4–10 éves gyermekek: 5–10 csepp (2,5–5 mg)

4 évesnél fiatalabb gyermekeknek az orvos utasítása szerint.

A GUTTALAX cseppet este kell bevenni; ebben az esetben másnap reggel várható a székletürítés.

Egyéb hashajtókhöz hasonlóan a GUTTALAXOT sem szabad hosszú időn keresztül nap mint nap szedni. Ha csupán hashajtó rendszeres szedésével biztosítható a székletürítés, ki kell deríteni a székrekedés kiváltó okát.

Ha az alkalmazás során a hatást túlzottan erősnek érzi, vagy a készítmény csekély hatásúnak bizonyul, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

Ha az előírtnál több cseppeket alkalmazott:

Nagyon fontos az orvos által előírt adagolás betartása. Ha véletlenül több GUTTALAX cseppeket vett be, haladéktalanul kérdezze meg kezelőorvosától, mi a teendő. Nagy adag GUTTALAX bevétele után hasi görcsök jelentkezhetnek és vízszerűen híg széklet távozhat; ez klinikai szempontból jelentős kálium-vesztést okozhat és egyéb elektrolitok hiányához vezethet.

A hashajtók krónikus túladagolása idült hasmenést, hasi fájdalmat, vesekövességet és csökkent vér-káliumszintet okozhat.

Ha adagját elfelejtette bevenni:

Következő alkalommal ne vegyen be dupla adagot, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének tenné ki magát. Folytassa a kezelést az előírtak szerint.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a GUTTALAX cseppeknek is lehetnek mellékhatásai. Ritkán hasi diszkomfort érzés, hasi görcs és hasi fájdalom fordult elő.

Hasmenés kialakulásáról is beszámoltak.

Igen ritkán allergiás jellegű reakciók, pl. bőrkiütés és angiooedema fordult elő a GUTTALAX egyidejű alkalmazásával.

A GUTTALAX hosszan tartó, mértéktelen alkalmazása folyadék- és elektrolit-zavarokat, illetve csökkent káliumszintet okozhat a vérben. Ha az itt felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb szokatlan tünetet észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. TÁROLÁS

Legfeljebb 25 °C-on fagyástól védve tartandó.

A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T-6851/01-02

Betegtájékoztató OGYI- eng. száma:
29393/55/2003