

SP54[®] gél

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

- *E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül.*
 - *Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.*
 - *Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
 - *További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.*
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható az SP 54 gél?
2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a gélt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

SP 54 gél

Hatóanyag: 15,0 mg pentozán-poliszulfát-nátrium (NPP) 1 g gélben

Segédanyagok: melissa olaj, törpefenyőolaj, rozmaringolaj, karbomer 940, trietanolamin, izopropanol, tisztított víz.

Leírás: Szintelen, átlátszó, jellemző illatú gél.

Csomagolás: 40 g, ill. 100g gél, csavaros PE kúppakkal lezárt alumínium tubusba töltve. Egy tubus dobozban.

A forgalombahozatali engedély jogosultja és gyártó: bene-Arzneimittel GmbH

München, Németország

1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ AZ SP 54 GÉL?

A készítmény lezajlott trombózis következményeinek – lábikra görcsök, duzzanat, visszeres fekélyek, vérömleny miatti pangás, fájdalom, nehéz-láb érzés – valamint sport- és baleseti sérülések (pl. ficam, rándulás, zúzódás, vérömleny), hegек kezelésére alkalmas.

2. TUDNIVALÓK A KÉSZÍTMÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a készítményt:

- ha túlérékeny a készítmény hatóanyagára
- vagy bármely segédanyagára
- nyílt sebre, nyálkahártyára.

Terhesség, szoptatás

Terhesség és szoptatás ideje alatt orvosi javaslatra alkalmazható.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Fenti képességeket a készítmény nem befolyásolja.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek:

Egyéb gyógyszerekkel való kölcsönhatás nem ismert.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A GÉLT?

A beteg terület nagyságától függően naponta 2-3-szor 2-5 cm gélcsíkot kell felvinni és vékony rétegben szétkenni. Bedörzsölni nem szabad.

Lábszárfekély kezelésekor a gélt az érintett bőrtérület körülötti területre kell felvinni. Sebre, nyálkahártyára ne kerüljön!

Tompa sérülést követő akut duzzanatok kezelésére legfeljebb 10 napig alkalmazható.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, az SP 54 gélnek is lehetnek mellékhatásai.

Ritkán túlérékenységi reakció léphet fel, a kezelt bőrfelszín szárazsága alakulhat ki. Mellékhatás észleléséről, vagy egyéb szokatlan tünetekről a kezelőorvost értesíteni kell.

5. TÁROLÁS

Legfeljebb 25°C-on tartandó.

A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel. A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T-6758/01-02

Betegájékoztató OGYI-eng. száma:

31.108/55/2003

62600331 / Z11-1