

**Cefzil 250 mg filmtabletta****Cefzil 500 mg filmtabletta**

cefprozil-monohidrát

**Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.**

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.
- Ezt a gyógyszert az orvos Önnek írta fel. Ne adja át a készítményt másnak, mert számára ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tünetei az Önéhez hasonlóak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

**A betegtájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer a Cefzil és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Cefzil alkalmazása előtt
3. Hogyan kell szedni a Cefzil-t?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Cefzil-t tárolni?
6. További információk

**1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CEFZIL ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?****Milyen típusú gyógyszer a Cefzil és milyen betegségek esetén alkalmazható?**

A készítmény fertőzőes megbetegedések kezelésére szolgáló ún. cefalosporin csoportba tartozó antibiotikum.

**2. TUDNIVALÓK A CEFZIL SZEDÉSE ELŐTT****Ne szedje a Cefzil-t**

ha allergiás (túlérzékeny) a cefprozilra vagy a Cefzil egyéb összetevőjére.

6 hónapos kor alatt nem adható.

**A Cefzil fokozott elővigyázatossággal alkalmazható**

A Cefzil-kezelés előtt penicillin-, cefalosporin- vagy egyéb gyógyszerallergiájáról, valamint vesebetegségéről, és arról, ha Ön terhes vagy szoptat, kezelőorvosát feltétlenül tájékoztassa.

**A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek**

Más gyógyszer egyidejűleg csak a kezelőorvos tudtával szedhető.

**Terhesség és szoptatás**

Terhesség vagy szoptatás idején csak az orvos kifejezett utasítására szedhető.

**A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

Nincs arra vonatkozó adat, amely szerint a Cefzil befolyásolná ezen képességeket.

**3. HOGYAN KELL SZEDNI A CEFZIL-T?**

Kizárólag orvosi rendelvényre alkalmazható. Adagolását és a kezelés időtartamát az orvos állapítja meg.

Tartós kezelés esetén az orvos által előírt időközönként laboratóriumi ellenőrző vizsgálatokon kell megjelenni.

**Ha az előírtnál több Cefzil-t vett be**

Mivel a cefprozil főleg a veséken át ürül, súlyos túladagolás esetén, főként csökkent vesefunkciójú betegeknél, hemodialízissel a készítmény eltávolítható a szervezetből.

**Ha elfelejtette bevenni a Cefzil-t**

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tabletta pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

**4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK**

Mint minden gyógyszer, így a Cefzil is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Ha a gyógyszer szedésekor allergiás reakció (bőrkiütés, viszketés) vagy súlyos hasmenés jelentkezik, a gyógyszer szedését meg kell szakítani, és azonnal orvoshoz kell fordulni.

A készítmény szedésekor hasmenés, hányinger, hányás, hasi fájdalom, szédülés előfordulhat. A jelentkező tünetekről tájékoztassa orvosát.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

**5. HOGYAN KELL A CEFZIL-TÁROLNI?**

Legfeljebb 30°C-on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon feltüntetett lejárati idő után ne szedje a Cefzil-t. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelessé vált gyógyszereit miként semmisítse meg.

Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

**6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK****Mit tartalmaz a Cefzil**

A készítmény hatóanyaga 250 mg illetve 500 mg cefprozil (cefprozil-monohidrát formájában) filmtablettánként.

Egyéb összetevők: Magnézium-sztearát, karboximetil-keményítő-nátrium, mikrokristályos cellulóz.

Bevonat: „Antifoam C” emulzió, „Opadry Orange YS-1-2546” (Cefzil 250 mg filmtabletta),

Magnézium-sztearát, karboximetil-keményítő-nátrium, mikrokristályos cellulóz.

Bevonat: „Antifoam C” emulzió, „Opadry White YS-1-7003” (Cefzil 500 mg filmtabletta).

**Milyen a Cefzil 250 mg, illetve 500 mg filmtabletta külleme és mit tartalmaz a csomagolás****Cefzil 250 mg filmtabletta**

Világos narancsszínű, hosszúkás alakú, domború felületű, egyik oldalán mélynyomású „250”, másik oldalán „7720” kódjelzéssel ellátott filmbevonatú tabletta. Törési felülete halványásárga színű.

- 10 db filmtabletta PVC/PVDC/Alu buborékfóliában, dobozban.

**Cefzil 500 mg filmtabletta**

Fehér színű, hosszúkás alakú, domború felületű, egyik oldalán mélynyomású „500”, másik oldalán „7721” kódjelzéssel ellátott filmbevonatú tabletta.

- 10 db filmtabletta PVC/PVDC/Alu buborékfóliában, dobozban.

**A forgalomba hozatali engedély jogosultja**

Bristol-Myers Squibb Gyógyszerkereskedelmi Kft.

1024 Budapest, Lövőház u. 39.

**Gyártó:**

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Via del Murillo Km 2800

Sermoneta (Latina)

Olaszország

OGYI-T-6357/01 (Cefzil 250 mg filmtabletta)

OGYI-T-6358/01 (Cefzil 500 mg filmtabletta)

**A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma:** 2008. december 12.