

Erolin®

szirup

Bizonyos allergiás betegségek tüneteinek kezelésére szolgáló gyógyszer.

Az Erolin szirup hatóanyaga a loratadin egyes hisztamin receptorok gátlása útján allergiás tüneteket csökkentő hatást fejt ki. Alkalmazása javasolt 2 év feletti életkorú gyermekeknek szezonális szénanátha, allergiás bőrpanaszok (pl. csalánkiütés) tüneteinek enyhítésére.

Orvosi rendelvényre.

Kizárólag az orvos által előírt adagban és ideig szabad alkalmazni.

Hatóanyag: 1 mg loratadin – 1 ml szirupban.

Segédanyagok: 3 g szacharóz (répacukor) 5 ml szirupban, nátrium-benzoát, vanília aroma, földieper aroma, vízmentes citromsav, glicerin, propilénlikol, desztillált víz.

Ellenjavallat

- Az Erolin szirupot nem szabad szedni a hatóanyaggal, ill. a szirup egyéb összetevőivel szembeni túlérzékenység esetén.
- 2 éves kor alatti gyermekeknek nem szabad adni.
- Terhesség, szoptatás ideje alatt nem szabad alkalmazni.

A gyógyszer szedésének elkezdése előtt:

A gyógyszert rendelő orvost korábbi vagy fennálló betegségekről (különösen máj- vagy vesebetegség, cukorbetegség) tájékoztatni kell.

Terhesség és szoptatás

Terhesség és szoptatás alatt (ha felnőttnek rendeli a gyógyszert az orvos) alkalmazása ellenjavallt, ezért ezek fennállásáról is tájékoztassa kezelőorvosát a gyógyszer szedésének elkezdése előtt.

Adagolás

Adagolása az orvos utasítása szerint történhet.

A szirupot étkezés előtt kell bevenni.

Ha az orvos másképpen nem rendeli szokásos adagja:

2–12 éves kor közötti gyermekeknek:

30 kg testsúly alatt naponta 1-szer 1 adagolókanál (1-szer 5 ml),

30 kg testsúly felett naponta 1-szer 2 adagolókanál (1-szer 10 ml).

A szirup bevitelére a mellékelt adagolókanál szolgál, amelyet teletöltve 5 ml szirup mérhető ki.

Ha elfelejti gyermekének beadni a napi adagját, igyekezzen pótolni mielőbb a kimaradt adagot, ill. ha már a következő adag beadása esedékes, hagyja el a kimaradtat, és ne adjon be egyszerre két adagot!





Mellékhatások

A gyógyszer mellékhatásaként ritkán előfordulhat: idegesség, asztmatikus nehézlégzés, fáradtság, kórosan fokozott mozgás, hasi fájdalom, kötőhártya gyulladás, hangképzési zavar, rossz közérzet.

Ezek, ill. egyéb szokatlan tünet jelentkezéséről tájékoztassa kezelőorvosát!

Gyógyszerkölsönhatás

Az Erolin szirup hatóanyagának, a loratadinnak a vérszintjét egyes egyidejűleg szedett gyógyszerek (pl. bizonyos antibiotikumok, gomba ellenes szerek, depresszió ellenes szerek) befolyásolhatják. Bár a klinikai vizsgálatokban nem észleltek ilyen esetekben hatás módosulást, ha Erolin szirup mellett más gyógyszert is kell szedni, mégis kérje ki orvosa véleményét.

Cukorbetegek

Cukorbetegeknek figyelembe kell venni a szirup szacharóz tartalmát.
1 adagolókanál (5 ml) szirup 3 g szacharózt tartalmaz.

Bőrteszt-vizsgálat

Bőrteszt-vizsgálatok (Prick-teszt) elvégzése előtt legalább 4 nappal abba kell hagyni az Erolin szirup szedését (hamis negatív eredmény elkerülése érdekében).

Járművezető képesség és baleseti veszéllyel járó munkavégzés

Ha a gyógyszer szedése során fejfájást, álmoságot, fáradtságot észlel, forduljon kezelőorvosához és kérje tanácsát, aki egyedileg mérlegelheti a járművezetés és veszéllyel járó munkavégzés engedélyezését.

Túladagolás

Túladagolás esetén felléphet álmoság, aluszékonyság, gyors szívverés, fejfájás. Gyermekeknél ezenkívül előfordulhatnak mozgászavarok és erős szívdobogás is. Ilyen esetben azonnal orvoshoz kell fordulni.

Eltartás: 2-25 °C közötti hőmérsékleten.

A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni.

A gyógyszert a lejárati időn belül szabad felhasználni. A lejárati idő a dobozon a gyártási szám alatt található.

Az üveg felbontása után a szirupot 6 hónapig szabad felhasználni.

Bármely további információért forduljon kezelőorvosához.

Gyártóhely: EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest

Forgalombahozatali engedély tulajdonosa:



EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
BUDAPEST

OGYI-T-7852/01

OGYI-eng. szám: 1567/40/2001.

EGIS dok. szám: 7336/3