

tabletta

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.
- E gyógyszert az orvos személyesen Önnek írta fel. A készítményt másoknak átadni nem szabad, mert számukra ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tünete az Önéhez hasonlóak.

Milyen betegségek esetén alkalmazható az Amoxicillin-B 750 mg és az Amoxicillin-B 1000 mg tablettá?

Baktériumok által okozott fertőző betegségek kezelésére alkalmas antibiotikum.

Milyen hatóanyagot tartalmaz az Amoxicillin-B 750 mg és az Amoxicillin-B 1000 mg tablettá?

Hatóanyag:

750 mg, ill. 1000 mg amoxicillin (amoxicillin trihidrát formájában) tablettánként.

Segédanyagok:

Vízmentes koloid-szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, kroszkarmellóz-nátrium, makrogol 6000.

Mielőtt az Amoxicillin-B tablettákkal történő kezelést megkezdené, kérjük, gondolja át az alábbi kérdéseket és beszélje meg azokat kezelőorvosával:

- érzékeny-e, vagy allergiás-e penicillinekre, cefalosporinokra vagy bármely más antibiotikumra?
- van-e valamilyen máj- ill. vesebetegsége?
- szed-e bármilyen gyógyszert jelenleg, vagy rendszeresen?
- szedett-e Ön a közelmúltban bármilyen gyógyszert?
- fennáll-e terhesség vagy annak valószínűsége?
- szoptat-e?

Mikor nem alkalmazható az Amoxicillin-B 750 mg, ill. az Amoxicillin-B 1000 mg tablettá?

- Ismert vagy feltételezett penicillin és/vagy cefalosporin túlérzékenység, vagy a kórelőzményben ezek szedésével összefüggésbe hozható sárgaság, ill. májműködési zavar.
- Mononucleosis infectiosa és a lymphoid leukaemia szekunder fertőzései.
- Terhesség és szoptatás ideje alatt minden esetben mérlegelni kell a kezelés várható előnyeit és lehetséges kockázatát.
- 12 éves kor alatt.

Mire kell figyelni az Amoxicillin-B 750 mg, ill. Amoxicillin-B 1000 mg tablettá alkalmazásakor?

Allergiás tünetek, súlyos, hosszantartó hasmenés, hányás, hányinger, viszketés, csalánkiütés, kanyaróserű vagy más bőrkiütések jelentkezésekor a gyógyszer szedését fel kell függeszteni és erről a kezelőorvost haladéktalanul tájékoztatni kell. A gyógyszer további szedése csak az orvos utasítására folytatható.

Hosszantartó kezelésnél az orvos által előírt laboratóriumi vizsgálatokon időközönként meg kell jelenni.

Adható-e a készítmény terhesség alatt és szoptatás idején?

Ismert vagy feltételezett terhesség, ill. szoptatás esetén feltétlen kérje ki orvosa tanácsát.

Más gyógyszerekkel együtt használható-e?

Más gyógyszer egyidejűleg csak orvosi előírásra szedhető, mivel együttes alkalmazásuk során módosulhat a gyógyszerek hatása.

A fogamzásgátló tabletták hatása csökkenhet amoxicillin kezelés alatt, ezért a kezelés idején más kiegészítő fogamzásgátló módszerek javasoltak.

Hogyan és mennyit kell szedni az Amoxicillin-B 750 mg, ill. az Amoxicillin-B 1000 mg tablettából?

A készítmény kizárólag orvosi rendelvényre, az orvos által előírt adagban és ideig adható.

Amennyiben az orvos másképpen nem rendel:

Felnőttek és 12 év feletti gyermekek szokásos napi adagja 3 x 1 tablettá, súlyosabb esetekben 2-3-szor kettő 1000 mg-os tablettá legalább 5 napig. A kezelést a tünetek megszűnte után még 2-3 napig kell folytatni.

Étekezés a felszívódást nem befolyásolja, de a mellékhatások csökkentése érdekében célszerű a tablettát étkezés közben, egészben, szétrágás nélkül, sok folyadékkal bevenni.

12 éves kor alatti gyermekeknek a kapszula, ill. a por szuszpenzióhoz gyógyszerforma alkalmazása javallt.

Milyen mellékhatások fordulhatnak elő az Amoxicillin-B 750 mg, ill. Amoxicillin-B 1000 mg tablettá alkalmazásakor?

A készítmény alkalmazása során enyhe gyomor-bélrendszeri zavar, émelygés, hányás, hasmenés jelentkezhet. Túlérzékenységi reakció, viszketés, csalánkiütés is lehetséges.

Fokozottan érzékeny egyéneknél szájnyálkahártya gyulladás léphet fel.

Mellékhatások jelentkezéséről, illetve egyéb nem várt tünetek észleléséről tájékoztassa kezelőorvosát.

Hogyan kell tárolni az Amoxicillin-B 750 mg, ill. Amoxicillin-B 1000 mg tablettát?

Legfeljebb 25 °C-on tartandó.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A forgalombahozatali engedély jogosultja: TEVA Gyógyszergyár Rt., Debrecen

OGYI-T-3785/01-02 (Amoxicillin-B 750 mg tablettá)

OGYI-T-3787/01-02 (Amoxicillin-B 1000 mg tablettá)

Betegtájékoztató OGYI eng. száma: 28 870/41/04

TEVA

3177003/1