

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

CANESTEN külsőleges oldat

klotrimazol

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei 2-4 héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Canesten oldat és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Canesten oldat alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Canesten oldatot?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Canesten oldatot tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CANESTEN OLDAT ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Canesten oldat hatóanyaga, a klotrimazol széles spektrumú ún. antimikotikum.

Alkalmas a bőr gombás megbetegedéseinek, fertőzésének helyi kezelésére a szárral nem fedett bőrfelületen, hajlatokban, lábujjak között, köröm/körömágy mentén illetve a nem gombás eredetű bőrgyulladás (erythrasma) kezelésére.

2. TUDNIVALÓK A CANESTEN OLDAT ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a Canesten oldatot

- ha allergiás (túlérzékeny) a klotrimazolra vagy a Canesten oldat egyéb összetevőjére.

A Canesten oldat alkalmazásával kapcsolatos óvintézkedések:

- A készítmény csak külsőlegesen alkalmazható.
- Ügyelni kell arra, hogy ne kerüljön a szembe.
- A Canesten oldat nem alkalmazható nyálkahártya kezelésére.
- Propilén-glikol tartalma miatt helyi bőrirritációt okozhat.

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

A Canesten oldat csökkenti azon készítmények hatását, melyek szintén a gombás megbetegedések kezelésére használatosak.

Terhesség és szoptatás

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

A készítmény rendeltetészerű alkalmazása esetén a hatóanyagnak igen kis mennyisége szívódik fel, így nem valószínűsíthető az ártalmassága. Ennek ellenére a terhesség első három hónapjában és a szoptatás időszakában csak a kezelőorvossal történt megbeszélés alapján alkalmazható.

Szoptatás ideje alatt az emlők területén nem alkalmazható.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A CANESTEN OLDATOT?

Az érintett bőrfelületre naponta 2-3 alkalommal vékony rétegben vigyen fel az oldatból és finoman dörzsölje be. Egy tenyérnyi bőrfelület kezelésére általában pár csepp elegendő.

A beteg bőrfelületet minden kezelés előtt le kell mosni és gondosan meg kell szárítani.

A kezelés időtartama változó, függ a megbetegedés súlyosságától, mértékétől és helyétől.

Fontos a készítmény rendszeres, megfelelő ideig történő használata.

A tünetek általában 2-4 hét alatt múlnak el.

A teljes gyógyulás érdekében a kezelést a tünetek megszűnése után célszerű még 2 hétig folytatni.

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Canesten oldat is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Ritkán felléphetnek bőrreakciók a kezelés területén, mint égő, csipő érzés, viszketés, bőrkirütés, bőrvörösség.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A CANESTEN OLDATOT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne alkalmazza a Canesten oldatot.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni.

Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy sürgősségül váltott gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Canesten oldat?

- A készítmény hatóanyaga: 1 ml oldat 10 mg klotrimazolt tartalmaz (200 mg klotrimazol van 20 ml oldatban)
- Egyéb összetevők: izopropil-alkohol, propilén-glikol, makrogol 400.

Milyen a Canesten oldat készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Leírás: Szintelen vagy halványsárga oldat.

Csomagolás: 20 ml oldat fehér, átlátszatlan műanyag tartályban, fehér cseppentővel és piros csavaros műanyag kupakkal lezárva, dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Bayer Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

A gyártó:

KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH
Projensdorfer Strasse 324
24106 Kiel, Germany

OGYI-T-8111/ 01

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2008. 05. 28.