

Mielőtt elkezdene alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.
- Ezt a gyógyszert az orvos személyesen Önnek írta fel. A készítményt másoknak átadni nem szabad, mert számukra ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tünetek az Önéhez hasonlóak.

Exoderil 1% oldat

10 ml

Mit tartalmaz az Exoderil 1% oldat?

Hatóanyag: 0,01 g naftifin-hidroklorid 1ml oldatban.

Segédanyagok. Propilénglikol, 96 %-os alkohol, tisztított víz.

Milyen típusú gyógyszer az Exoderil 1% oldat és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Az Exoderil 1% oldat a gombás fertőzések külsőleges kezelésére szolgál, hatóanyagként naftifint tartalmaz. Hatékony a bőrgombák, az élesztőgombák, a penészgombák és egyéb gombafajták ellen. Számos különböző baktérium ellen is hat, amelyek gyakran fordulnak elő a gombás fertőzésekkel együtt.

A lábak, különösen a lábujjak közötti területek és a talp gombás megbetegedései (amelyek a kipirulás, a hámlás és a duzzanat, illetve a viszkető hólyagocskák alapján felismerhetők) és körömgombásodás esetén alkalmazható.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Sandoz GmbH, 6250 Kundl, Austria

Mikor nem szabad alkalmazni az Exoderil 1% oldatot?

Ellenjavallatok:

A naftifin vagy a propilénglikol illetve a készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.

Mire kell figyelemmel lennie terhesség és szoptatás esetén?

Az előírásoknak megfelelő alkalmazás esetén nem várható a magzatra, illetve az anyatejjel táplált csecsemőre gyakorolt hatás.

Az alkalmazással kapcsolatos elővigyázatossági óvatossági intézkedések és figyelmeztetések

Ne használja az Exoderil oldatot, ha az „Ellenjavallatok” alatt felsoroltak valamelyike Önre illik!

Az Exoderil 1% oldat csak külsőleg alkalmazható, szembe nem kerülhet!

Az oldatot nem szabad sérült bőrterületekre felvinni, mivel a benne lévő alkohol fájdalmas égő érzést okozhat.

A panaszok további fennállása esetén, illetve ha az alkalmazástól várt eredmény nem következik be, mielőbb forduljon tanácsért orvosához!

Szabad-e más gyógyszerekkel együtt alkalmazni az Exoderil 1% oldatot?

Nem ismeretesek kölcsönhatások más gyógyszerekkel.

Milyen gyakran és milyen mennyiségben alkalmazza az Exoderil 1% oldatot?

Amennyiben a kezelőorvos másképp nem rendel, tartsa be pontosan az alábbi adagolást:

Az Exoderil 1% oldatot naponta egyszer kell felvinni a megtisztított és alaposan megszáritott beteg bőrterületekre. Mivel az Exoderil oldat jól felszívódik a bőrbe, és sokáig megmarad annak a különböző rétegeiben, ezért elég naponta egyszer alkalmazni.

A gombás bőrbetegségek esetében fontos, hogy a panaszok (viszketés, égő érzés, stb.) gyors javulása ellenére a kezelést még két hétig folytatni kell a betegség valamennyi tünetének a megszűnése után, hogy tartós gyógyulást lehessen elérni.

A körömgombásodás kezelése előtt és alatt a körmöket lehetőleg rövidre kell vágni, a felszínüket pedig le kell reszelni. A körmök gombás megbetegedését több hónapon keresztül kezelni kell, amíg egészséges köröm utána nem nő.

Annak az érdekében, hogy mielőbb meggyógyuljon a gombás megbetegedés (orvosi nevén: mikózis), szíveskedjék betartani az alábbi szabályokat:

1. A megbetegedett bőrrel érintkezésbe kerülő ruhadarabokon megtapadhatnak a gombás betegség kórokozói. Ezért naponta váltsa az ilyen ruhadarabokat!
2. A gombás fertőzések ellen a legjobb védelem az ép és mindenekelőtt száraz bőrfelület. Óvakodjék ezért a beteg bőrterületekre szorosan ráfekvő és a levegőt kevésbé átteresztő öltözképtől (pl. műszálas zokni szűk cipőben). A megbetegedett bőrterületeket mosdás után gondosan szárazra kell törölni. A mosdókesztyűt és a törölközőt naponta cserélni kell.
3. Lábgombásodás esetén otthon, fürdőben, vagy pl. szállodában se járjon meztől! Így elkerülheti a kórokozók továbbterjesztését, és mindenekelelt az ismételt fertőződést.
4. Szauzába és gőzfürdőbe csak a gombás fertőzés gyógyulása után menjen ismét!

Hogyan használja az Exoderil 1% oldatot?

A cseppeket az üvegcséből közvetlenül kicsepegtetve vagy egy kis vattacsomóval lehet felvinni.

Az Exoderil hígítás nélkül alkalmazandó. Más helyi készítménnyel összekeverni nem szabad, mivel ez csökkentheti a hatóanyag koncentrációját, és ezáltal a készítmény hatékonyságát.

Milyen mellékhatások fordulhatnak elő az Exoderil 1% oldat alkalmazása során?

Helyi túlérzékenységi tünetek jelentkezhetnek, mint szárazsággérzés, bőrpír és égő érzés. Emiatt csak ritkán kell megszakítani a kezelést. A kezelés befejeztével a mellékhatások megszűnnek.

Ha bármely egyéb mellékhatást tapasztal, amiről nem esett szó ebben a tájékoztatóban, kérjük jelezze orvosának vagy a gyógyszerészének.

A lejárati időre és a tárolásra vonatkozó megjegyzések

A készítmény 30 °C alatti hőmérsékleten tartandó.

A lejárati időn túl ne használja a gyógyszert.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez.

OGYI-T-6532/01

Beteg tájékoztató OGYI-eng. száma: 13.482/55/2003

Exoderil® and  **SANDOZ** are registered trademarks of Novartis.

Sandoz GmbH, Kundl-Austria