

NASOPAX orrspray gyermekeknek (Meditop Gyógyszeripari Kft.)

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi beteg-tájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása. Tartsa meg a beteg-tájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 4 héten belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak. További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.

Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a készítmény?

Hatóanyagok: 6 mg bromhexinium chloratum és 0,5 mg oxymetazolinium chloratum üvegenként. 0,06 mg bromhexinium chloratum és 0,005 mg oxymetazolinium chloratum adagonként (0,1 ml).

Segédanyagok: nátrium-edetát, benzalkónium-klorid, tejsav, nátrium-hidroxid, tisztított víz.

Mely esetben alkalmazható ez a gyógyszer?

Olyan állapotokban, amikor az orr nyálkahártyája gyulladt és duzzadt, az orrlégzés nehezített, a duzzadt nyálkahártya miatt az arcüregek belső kivezető járatai zártak, valamint a belső füljárat is zárt. Ilyen állapotok az egyszerű nátha, az allergiás és az ún. "vasomotoros" orrnyálkahártya gyulladás, a felsőlégtűi gyulladások (melynek kellemetlen tünetei az orrdugulás, tüsszögés, orrfolyás, orrvizketés, könnyezés), valamint a heveny arcüreggyulladás.

Mikor nem szabad használni ezt a gyógyszert?

Súlyos szív-és érrendszeri megbetegedések, továbbá a hatóanyagokkal vagy a segédanyagokkal szembeni ismert túlérzékenység esetén, valamint száraz orrnyálkahártya gyulladás esetén a készítményt ne használja.

Mire figyeljen az alkalmazás során?

A szokásos alkalmazási módtól és adagolástól ne térjen el! A Nasopax orrspray gyermekeknek, vény nélkül kapható, de alkalmazása és adagolása csak a beteg-tájékoztatóban leírtaknak megfelelően történjen. Zöldhályogban (glaucoma) szenvedő betegek esetén fokozott óvatosság szükséges.

Alkalmazható-e más gyógyszerekkel egyidejűleg?

Depresszió kezelésére szolgáló gyógyszerrel egyidejűleg vagy annak használata után közvetlenül történő alkalmazása vérnyomás emelkedést idézhet elő.

Hogyan alkalmazza a készítményt?

Szokásos adagja: gyermekeknek, 3 éves kortól, naponta háromszor, 2-2 adagot (permetet) kell juttatni egy-egy orrnyílásba.

Az orrspray használata: az adagolópumpát az orrnyílásba kell illeszteni, és az adagolópumpa egyszeri, erőteljes lenyomásával az első adagot az orrnyílásba juttatni. Ez megismételendő a másik orrnyílás esetén is. A két adag befúvása között 5-10 másodperc szünetet kell tartani.

Mennyi ideig alkalmazható a gyógyszer?

A készítményt a tünetek fennállásának ideje alatt, megszakítás nélkül, folyamatosan kell alkalmazni. A kezelés időtartama legfeljebb 4 hét lehet.

Mi a teendő túladagolás esetén?

Azonnal értesíteni kell a kezelőorvost!

Mit tegyen, ha egy vagy több adag befújása elmaradt?

Amint észrevette, hogy elfelejtett befújni egy adagot, pótolja azt minél előbb.

Kialakulhatnak-e mellékhatások az alkalmazás során?

Alkalmazása során esetenként előfordulhat égő, csípő érzés, tüsszögés, ritkán szívdobogásérzés, vérnyomásemelkedés. Igen ritkán előfordulhat izgatottság, álmatlanság, álmoság.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Szobahőmérsékleten (15-25 °C között) tartandó.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni.

OGYI-T-8270/01

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 9496/41/2002.

BNGY0805