

GÉL carbosan

**AJAKFÁJDALMAK, SZÁJÜREGI FEKÉLYEK,
SZÁJNYÁLKAHÁRTYA APHTÁS ELVÁLTOZÁSAIRA**

20,8 mg carbenoxolonum natrium grammenként

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múlt panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 2 héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a készítmény?

Hatóanyag: 20,8 mg carbenoxolonum natrium grammenként.

Segédanyagok: polyol-zsírsav-észter (CETIOL HE), citromolaj, imidurea (BIOPURE 100), nipastát nátrium (metil-, etil-, propil-, butil-hidroxi-benzoát nátriumsója), izo-oktil-sztearát (CETIOL 868), polioxil-30-cetosztearil-alkohol(EMULGIN B.3), tisztított víz.

Milyen betegségek esetén alkalmazható a gél?

Ajaktájdalom, valamint szájnnyálkahártya-fekély tüneteinek enyhítésére és kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény. Rövid időn belül csökkenti a fájdalmat és elősegíti a természetes gyógyulási folyamatot.

Hogyan kell alkalmazni a Carbosan gélét?

Kizárólag külsőleg, helyileg alkalmazható.

Ha az orvos másképpen nem rendeli, a géllal naponta 4 alkalommal, vastagon kell bekenni az érintett bőr-, illetve szájnnyálkahártya felületet, lehetőleg étkezések után és lefekvéskor. A gélét az ajaktájdalom vagy szájnnyáregi fekély első tüneteinek jelentkezésekor (bizsergés vagy égő érzés) célszerű alkalmazni és a lehető legtovább kell az érintett területen hagyni.

Alkalmazás után a kupakot minden esetben szorosan vissza kell csavarni.

Amennyiben tünetei 2 hét után nem szűnnek meg, keresse fel kezelőorvosát.

Mikor nem alkalmazható a készítmény?

- A készítmény hatóanyagával vagy segédanyagaival szembeni érzékenység esetén,
- bizonyos bőr- és nyálkahártya daganatok és nemi betegség esetén.
- A készítmény nem alkalmazható súlyos szív-, vese, és májkárosodás, magas vérnyomás, egyidejű szívglikozid kezelés, alacsony szérumalbumin szint esetén,
- 3 éves kor alatt,
- idős korban,
- terhesség és szoptatás idején.

Bakteriális felülfertőződés esetén megfelelő kezelést kell alkalmazni.

Milyen mellékhatások léphetnek fel a kezelés ideje alatt?

Mellékhatások kialakulását nem észlelték.

Befolyásolja-e a gél a járművezetői és gépkezelői képességeket?

Ezeket a képességeket a készítmény nem befolyásolja.

Alkalmazható-e a készítmény terhesség és szoptatás ideje alatt?

Alkalmazása terhesség és szoptatás ideje alatt ellenjavallt.

Mi a teendő túlادagolás esetén?

Előírás szerű alkalmazás esetén túlادagolást nem észleltek.

Gyermekek esetében figyelni kell arra, hogy nagy mennyiségű gélt ne nyeljenek le, mivel lenyelve étvágy- és anyagcserezavarokat, valamint vérnyomásemelkedést okozhat.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

25°C alatti hőmérsékleten tárolandó.

A gyógyszerert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni. A gyógyszerert gyermekek elől gondosan el kell zárni.

A forgalombahozatali engedély jogosultja:

Rowa Pharmaceuticals Ltd., Ireland

OGYI-T-8529/01

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 9185/40/2002



ROWA®

PHARMACEUTICALS LIMITED

Bantry, Co Cork, Ireland.

Hungary L/16a 11-02

Hungary L/16a 11-02

Hungary L/16a 11-02