

A dobozon feltüntetett lejárati idő („Felhasználható:”) után ne szedje a DETRALEX filmtablettát.

A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ez a gyógyszer nem igényel különleges tárolást.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét

## 6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

### Mit tartalmaz a DETRALEX filmtabletta

- A készítmény hatóanyaga: 500 mg tisztított és mikronizált flavonoid frakció (450 mg diozmin és 50 mg heszperidin) filmtablettánként.
- Egyéb összetevők: magnézium-sztearát, talkum, karboximetilkenyérítő-nátrium, zselatin, mikrokristályos cellulóz,
- bevonat: nátrium-lauril-szulfát, vörös vas-oxid (E 172), sárga vas-oxid (E 172), magnézium-sztearát, glicerin, makrogol 6000, titán-dioxid (E 171), hipromellóz.

### Milyen a DETRALEX filmtabletta külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Lazac-színű, ovális filmtabletták.

Csomagolás: 30 db/ 60 db filmtabletta buborékfóliában és dobozban.

### A forgalomba hozatali engedély jogosultja



Les Laboratoires Servier  
Neuilly-sur-Seine  
Franciaország

### A gyártó

Les Laboratoires Servier Industrie  
905 route de Saran  
45520 Gidy  
Franciaország

OGYI-T-1609/01-02

A betegájékoztató engedélyezésének dátuma: 2009. február 25.

## BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

# detralex® 500 mg filmtabletta

tisztított, mikronizált flavonoid frakció

**Olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő bevétele.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

### A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a DETRALEX 500 mg filmtabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a DETRALEX 500 mg filmtabletta szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a DETRALEX 500 mg filmtablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a DETRALEX 500 mg filmtablettát tárolni?
6. További információk

### 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A DETRALEX 500 MG FILMTABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A DETRALEX filmtabletta érvédő hatású gyógyszer. Gátolja a vénák tágulását, és növeli a hajszálerek ellenállását.

Az alsó végtag idült vénás elégtelenségének kezelésére ajánlott az alábbi esetekben: nehézláb érzés, feszülés, fájdalom, éjszakai lábikragörcs. Alkalmos heveny aranyeres krízis kezelésére is.

0230056492



## 2. TUDNIVALÓK A DETRALEX 500 MG FILMTABLETTA SZEDÉSE ELŐTT

### **Ne szedje a DETRALEX filmtablettát**

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagra vagy a DETRALEX filmtabletta egyéb összetevőjére.

### **A DETRALEX filmtabletta fokozott elővigyázatossággal alkalmazható**

Heveny aranyeres roham esetén, ha a tünetek a rövid távú kezelés hatására (15 napon belül) nem javulnak, kérjen orvosi tanácsot.

Vénás betegség esetén a legkedvezőbb hatás a megfelelő életmód biztosítása mellett érhető el. Kerülni kell a napon való tartózkodást, hosszú ideig történő állást, túlsúlyt. A séta és a megfelelő kompressziós harisnya viselése javíthatják a keringést.

Amennyiben kérdései vannak, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

### **A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek**

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. Más gyógyszerekkel kialakult kölcsönhatások eddig nem ismertek.

### **A DETRALEX filmtabletta egyidejű bevétele bizonyos ételekkel vagy italokkal**

A DETRALEX filmtablettát étkezés közben kell bevenni.

### **Terhesség, szoptatás**

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Általános óvatosságból terhesség alatt jobb kerülni a DETRALEX filmtabletta alkalmazását.

A készítménynek anyatejben való kiválasztódásáról nincs adat, ezért a szoptatás ideje alatt a gyógyszer szedése nem ajánlott.

### **A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

A DETRALEX filmtabletta ilyen hatásait nem vizsgálták.

### **Gyermekkor**

A DETRALEX filmtabletta gyermekek és serdülők kezelésére nem ajánlott.

## 3. HOGYAN KELL SZEDNI A DETRALEX 500 MG FILMTABLETTÁT?

A DETRALEX filmtablettát mindig az orvos által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény szokásos adagja felnőtteknek napi 2 tablettát, elosztva délből és este, 1-1 tablettát. A tablettákat étkezés közben kell bevenni.

Aranyeres roham esetén az első 4 napon keresztül napi 6 tablettát (2x3 tablettát), majd további 3 napon keresztül napi 4 tablettát (2x2 tablettát), étkezés közben bevéve.

Amennyiben úgy találja, hogy a gyógyszer hatása túl erős vagy túl gyenge, forduljon kezelőorvosához. Szigorúan kövesse az orvos utasításait!

### **Ha elfelejtette bevenni a DETRALEX filmtablettát**

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására!

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

## 4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a DETRALEX filmtabletta is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Gyakori (100 betegből 1-10-nél fordul elő) mellékhatások:

- hányinger, hányás, hasmenés, emésztési zavarok.

Ritka (10 000 betegből 1-10-nél fordul elő) mellékhatások:

- fejfájás, szédülés, rossz közérzet, bőrkkiütés, viszketés, csalánkiütés.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

## 5. HOGYAN KELL A DETRALEX 500 MG FILMTABLETTÁT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!