


NUROFEN®

FORTE drazsé



Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót. Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körülmények közötti alkalmazása.

Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.

Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer Nurofen Forte drazsé és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Nurofen Forte drazsé szedése előtt.
3. Hogyan kell szedni a Nurofen Forte drazsét?
4. Lehetséges mellékhatások.
5. A készítmény tárolása.

Mit tartalmaz a Nurofen Forte drazsé?

Hatóanyag:

400 mg ibuprofen drazséként.

„Segédanyagok:

Nátrium-lauryl-szulfát, vízmentes kolloid szilícium-dioxid, sztearinsav, krószkarmellóz-nátrium, trinátrium-citrát.

Bevonat: makrogol 6000, porlasztva szárított arabemzga, karmellóz-nátrium, titán-dioxid (E171), talkum, szacharóz.

Felirat: „Opacode S-1-9460 HV Brown” (vörös vas-oxid E 172, sellak, szója-lecitin, „Antifoam DC 1.510” habzsgátló).

Drazsé.

Fehér, illetve csaknem fehér színű, kerek, domború felületű, egyik oldalán piros színű „NUROFEN 400” jelzéssel ellátott cukros bevonatú tableta. Törési felülete fehér színű.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, UK

Gyártó: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd. Nottingham, UK

1. Milyen típusú gyógyszer a Nurofen Forte drazsé és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A gyógyszerkészítmény csökkenti a fájdalmat és a lázat, mérsékli a gyulladást. Gyorsan és hatásosan csökkenti a fejfájást, a menstruációs fájdalmakat, a hátfájást, a reumás- és izomfájdalmakat, a fogfájást, a neuralgiás fájdalmakat, a meghűléses és influenzás tüneteket. Hatásos lázcsillapító is. Az ibuprofen a nem szteroid gyulladáscsökkentők csoportjába tartozik, amelyek a szervezetnek a fájdalomra, gyulladásra és lázra adott kémiai válaszát tudják befolyásolni.

2. Tudnivalók a Nurofen Forte drazsé szedése előtt

Mely esetekben nem szedheti a Nurofen Forte drazsét?

Ha az előzőekben felsorolt bármely összetevővel szemben ismert túlérzékenység áll fenn, illetve, ha szalicilát tartalmú vagy más nem szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek szedésekor légzőszavart, bőrkütiést, bőrvizketést vagy orrfolyást észlelt. A Nurofen Forte drazsé nem szedhető gyögyult vagy jelenleg is fennálló fekálybetegség vagy más súlyos emésztőszervi betegség esetén. Súlyos máj- és veseelégtelenség, illetve kezeletlen szívelégtelenség szintén a gyógyszer szedésének ellenjavallatát képezi. Nem adható 12 éves életkor alatti gyermekeknek. Terhesség vagy szoptatás ideje alatt nem szedhető.

Milyen esetekben kell orvosa tanácsát kikérni a Nurofen Forte drazsé szedésének megkezdése előtt?

- Ha már volt, illetve jelenleg is van bármilyen emésztőszervi betegsége,
- már volt, illetve jelenleg is van asztmás megbetegedése,
- máj-, szív-, magasvérnyomás- vagy veseproblémái vannak,
- bizonyos immunológiai megbetegedése (SLE, kevert kötőszöveti megbetegedés) van,
- fruktóz, glükóz, galaktóz, szacharóz (gyümölcscukor, szőlőcukor, tejcukor, répacukor) örökletes vagy szerzett emésztési rendellenessége esetén,
- idős korú,
- más gyógyszert is szed, különösen, ha:
- szalicilátot vagy egyéb nem szteroid fájdalomcsillapítót,
- vérnyomáscsökkentő vagy vízhajtó hatású szert,

- véráldadásgátlót, illetve
- lítiumot, melhetrexatol, dígoxint, vagy fenitoint tartalmazó készítményt.

Figyelem!

A Nurofen Forte drászé 232,2 mg szacharózt tartalmaz tablettánként, melyet cukorbetegségben szenvedők diétájában figyelembe kell venni.

Szedhető-e egyéb gyógyszer a Nurofen Forte drászéval egyidőben?

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszeréről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is. Az ibuprofen a véráldadásgátló tabletták és a heparin hatását fokozza. Egyéb nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel, kortikoszteroidokkal együtt adva az emésztőszervi panaszok és a vérzés veszélye növekszik. Befolyásolja a vízhatók hatását. Csökkenti egyes vérnyomáscsökkentők és szívritmusszabályozók hatását. Fokozza a szulfonamidok, lítium, fenitoin, metotrexat, dígoxin hatását. Zidovudinnal kezelt HIV + hemofilás betegek ibuprofen terápiája esetében fokozódik a vérórmény, ízületi vérzés kialakulásának lehetősége.

Mire kell figyelni terhesség és szoptatás idején?

Terhesség és szoptatás ideje alatt alkalmazása nem javasolt, mivel sem magzatkárosító hatása, sem veszélytelensége nem bizonyított. Az anyatejbe alacsony koncentrációban választódik ki.

A Nurofen Forte drászé hatása a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

A járművezetői képességeket és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolhatja, ezért a kezelőorvosnak egyedileg kell meghatározni, hogy a gyógyszer milyen mennyisége és mely adagolási módon történő alkalmazása mellett szabad az említett tevékenységeket végezni.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A NUROFEN FORTE DRAZSÉT?

Amennyiben a kezelőorvos másképpen nem rendeli, a készítmény szokásos adagja felnőttek és 12 éven felüli gyermekek számára: kezdő adagként 1 drászét kell kevés vízzel bevenni. Szükség esetén további 1 drászé 4 óránként bevehető. A maximális napi adag 3 drászé, ami 1200 mg ibuprofennek felel meg; ennél többet bevinni nem szabad!

Mi a teendő, ha a maximális napi adagként megadott 3 drászénál többet vett be?

Ebben az esetben azonnal forduljon orvoshoz! A túladagolás tünetei: hányinger, hányás, szédülés, alacsony vérnyomás, aluszékonyág, ritkán eszméletvesztés.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a Nurofen Forte drászének is lehetnek mellékhatásai. Ritkán fordulnak elő mellékhatások, melyek a gyógyszer szedésének abbahagyásával rendszerint gyorsan elmúlnak. A leggyakoribb mellékhatások gyomorfájdalom, emésztési zavarok, émelygés. Egyes esetekben fekélybetegség, emésztőszervi vérzés (melynek tünete fekete széklet lehet) fordulhat elő. Ritkán különféle allergiás reakciók, mint bőrkíütés, viszketés, hámló bőrgyulladás is kialakulhat. A készítmény szalicilatra érzékeny asztmás betegekben hörgőgörcsöt válthat ki. Súlyos túlérzékenység esetén arc-, nyelv-, gégeduzzanat, nehézlégzés, szapora szívverés, vérnyomás-esés, sokk is felléphet. Előfordulhat máj- és vesefunkció károsodás, fejfájás, szédülés, hallászavar, és igen ritkán vérzékenység. Ha az itt felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb szokatlan tünetet észlel, azonnal függessze fel a kezelést és forduljon orvoshoz!

Figyelem!

Ha a panaszok nem enyhülnek, a láz, vagy fájdalom 3 nap elmúltával változatlanul fennáll esetleg rosszabbodik, vagy új tünetek kialakulását észleli, keresse fel orvosát! Idős korban gyakrabban lehet mellékhatások kialakulására számítani. Csak a szükséges legkisebb adagban és legrövidebb ideig alkalmazza, mert így kisebb a mellékhatások kialakulásának lehetősége. Tartós alkalmazás esetén szükséges az orvos által javasolt vizsgálatokat elvégezteni.

5. A KÉSZÍTMÉNY TÁROLÁSA

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Az eredeti csomagolásban tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A gyógyszerert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Csomagolás

10 db ill. 12 db drászé fehér, átlátszatlan PVC/PVDC/Al vagy PVC/Al buborékfóliában és dobozban.

OGYI-T-8856/01-02.



Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., UK