

STREPFEN szopogató tablettá

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás elérése érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszerek körültekintő, szakszerű alkalmazása.

- *Tartsa meg e betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha a tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.*

Milyen betegségek esetén használható és hogyan fejti ki hatását a Strepfen szopogató tablettá?

Hatékonyan alkalmazható a baktériumok vagy vírusok által kiváltott torokgyulladás tüneteinek (fájdalom és nyálkahártya duzzanat) csökkentésére.

Gyorsan enyhíti a helyi tüneteket, a kínzó torokfájást.

Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a Strepfen szopogató tablettá?

Hatóanyag: 8,75 mg flurbiprofén tablettánként.

Segédanyagok: levomentol, kálium-hidroxid, citrom-aroma, makrogol 300, méz, szacharóz szirup, glükóz szirup.

Mikor nem szabad Strepfen tablettát szedni?

A készítmény hatóanyagával vagy bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén. Gyomorfekély, fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa) esetén.

Nem adható olyan betegeknek, akiknél előzőleg szalicilátok vagy más nemszteroid gyulladásgátlók szedésével összefüggésben bronchusgörcs, orrnyálkahártya gyulladás vagy csalánkiütés jelentkezett.

A terhesség utolsó harmadában.

Nem javasolt 12 éves kor alatti gyermekeknek.

Mit kell tudni a kezelés megkezdése előtt?

Ha a gyógyszer alkalmazásakor néhány, maximálisan 3 napon belül a tünetek nem enyhülnek, vagy láz, fejfájás, émelygés, hányás is jelentkezik, más terápiás kezelésre van szükség, és orvoshoz kell fordulni.

A Strepfen szopogató tablettá egyedi orvosi elbírálás alapján adható:

Szív-dekompenzációs zavarok, ill. magas vérnyomás esetén, mert más nemszteroid gyulladásgátlókhöz hasonlóan folyadék-visszatartást és ödémát okozhat.

Vese, szív és májkárosodás esetén, mert a nemszteroid gyulladásgátlók a vesefunkciók romlását okozhatják.

Fokozott vérzékenységi hajlam esetén, mert a flurbiprofen megnyújthatja a vérzési időt.

A mellékhatások kockázata csökkenthető, ha szedése a lehetséges legkisebb adagban és legrövidebb ideig történik.

Szedhető-e a Strepfen szopogató tablettá a terhesség és szoptatás időszakában?

Amennyiben Ön terhes vagy szoptat, tájékoztassa orvosát és kérje ki tanácsát a gyógyszer szedése előtt.

A készítmény a terhesség utolsó három hónapjában nem alkalmazható.

Szedhet-e egyéb gyógyszert a Strepfen szopogató tablettával egyidőben?

A Strepfen szopogató tablettá több gyógyszerrel (vízhajtók, vérárvadás gátlók, lítium) léphet kölcsönhatásba, ezért a jelenleg, illetve közelmúltban szedett vényköteles vagy vény nélkül kivaltható gyógyszeréről tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét.





Forduljon orvosához, ha a fenti pontok valamelyike érinti Önt, vagy bármikor a múltban érintette Önt.

Hogyan hat a Strepfen szopogató tablettá a gépjárművezetéshez, veszélyes gépek kezeléséhez szükséges képességekre?

Nem észleltek ilyen hatást.

Hogyan kell alkalmazni a Strepfen szopogató tablettát?

Felnőttek és 12 éven felüli gyermekek: 3-6 óránként 1 tablettát kell lassan elszopogatni. 24 óra alatt legfeljebb 5 tablettá fogyasztható el. 3 napnál tovább szedése nem javasolt.

Nem adható 12 éves kor alatti gyermekeknek.

Idősek: nem szükséges az adagolás módosítása.

A Strepfen szopogató tablettát teljes feloldódásig folyamatosan szopogatni kell a szájnyalkahártya irritáció elkerülése érdekében.

A megadott adagot nem szabad túllépni.

Milyen tünetek jelentkeznek túladagoláskor?

A túladagolás tünetei: hányinger, hányás, fejfájás, aluszékonyság, homályos látás és szédülés.

Mi a teendő a tablettá esetleges túladagolása esetén?

Ha az előírtól több Strepfen szopogató tablettát vett be, azonnal forduljon orvosához.

A túladagolás kezelése: specifikus ellenszere nem ismeretes. Gyomormosás és amennyiben szükséges, a folyadékháztartás helyreállítása javasolt.

Mi a teendő, ha elfelejtett bevenni egy adagot?

Ha adagját elfelejtette bevenni, a következő alkalommal ne vegyen be dupla adagot, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének teszi ki magát.

Milyen nem kívánt hatásai lehetnek a Strepfen szopogató tablettának és mi a teendő, ha ezek jelentkeznek?

Mint minden gyógyszernek, a Strepfen szopogató tablettának is lehetnek mellékhatásai.

A Strepfen szopogató tablettá átmeneti szájnyalkahártya irritációt válthat ki. A klinikai vizsgálatok során leggyakrabban észlelt mellékhatás az ízérzés zavara.

Előfordulhat még: emésztési zavar, hányinger, hányás, hasmenés, fekélyképződés a szájnyalkahártyán, folyadék-visszatartás, ödéma. Ritkán vérzés a gyomor-bél rendszerben, fekély kiújulása.

Minden gyógyszerrel szemben kialakulhat túlérzékenységi reakció. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben szokatlan tüneteket (pl. duzzadás, bőrkíütés, hirtelen vérnyomásesés stb.) észlel, a gyógyszer szedését hagyja abba, és feltétlenül forduljon kezelőorvosához.

Hogyan kell a Strepfen szopogató tablettát tárolni?

Legfeljebb 25°C-on, száraz helyen kell tartani.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Slough, UK

Gyártó: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, UK

OGYI-T-8900/01

Betegájékoztató OGYI-eng. száma: 2696/41/2006