

Mezym® forte 10000 filmtabletta

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- *E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.*
- *Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.*

Mit kell tudni a készítmény összetételéről?

Pancreatis pulvis (porcus) [pankreáz-por (disznó eredetű)] 125 mg + 12,5 mg felülmérés
Megfelel az alábbi enzim aktivitásoknak:

Lipáz	minimum	10000 Ph. Eur. U.
Amiláz	minimum	7500 Ph. Eur. U.
Proteáz	minimum	375 Ph. Eur. U.

Segédanyagok:

Töltet: laktóz, vízmentes szilícium-dioxid, magnézium sztearát, kroszpovidon, mikrokristályos cellulóz

Bevonat: nátrium-hidroxid, makrogol 6000, szimetikon, karmellóz-nátrium, Azorubin E 122, poliszorbát 80, trietil-citrát, hipromellóz, titán-dioxid E 171, talkum, metakrilsav-etil-akrilát kopolimer.

Milyen hatástani csoportba tartozik ez a gyógyszer?

Hasnyálmirigy emésztő enzimek.

Milyen esetekben használható Mezym® forte 10000?

A Mezym® forte 10000 a hasnyálmirigy eredetű emésztő enzimek képzésének vagy felszabadulásának, emésztési panaszokat okozó zavarában használható.

Milyen esetekben nem használható ez a gyógyszer?

A Mezym® forte 10000 nem használható a hasnyálmirigy heveny gyulladásában vagy idült gyulladásának heveny szakaszaiban, a betegség legsúlyosabb periódusában, illetve a gyógyszer bármely összetevője iránti túlérzékenység esetén.

Milyen egyéb gyógyszerekkel nem szabad együtt szedni a Mezym® forte 10000 filmtablettát?

Eddig nem ismert, hogy a Mezym® forte 10000 kölcsönhatásba lépne más gyógyszerekkel. Említse meg mégis orvosának, hogy milyen egyéb gyógyszereket szed vagy szedett mostanában.

Alkalmazható-e a készítmény terhesség és szoptatás ideje alatt?

Terhesség ill. szoptatás ideje alatt egyedi elbírálás alapján használható.

Hogyan kell szedni a készítményt?

A Mezým® forte 10000 filmtabletta adagolását a meglévő emésztési zavarok súlyossága határozza meg. A megfelelő dózist egyénileg kell kialakítani. Általában 1-2 filmtablettát kell bevenni étkezés közben. Az étkezés típusától valamint az emésztési zavar súlyosságától függően a szükséges dózis lényegesen magasabb is lehet. Különösen cysticus fibrosisban szenvedő betegeknél a dózis az étel minőségétől és összetételétől függően ne haladja meg a szükséges zsírmennyiség emésztéséhez igényelt enzim adagot. A dózis csak orvosi ellenőrzés mellett emelhető, és csak akkor, ha a tünetek (pl.: zsíros széklet és hasi fájdalom) mérséklődnek. A napi lipáz enzim adag testsúly kg-ként ne haladja meg a 15000-20000 egységet.

Gyermekek: orvosnak kell meghatározni a szükséges dózist és a kezelés időtartamát. A filmtablettát egészben kell lenyelni. A bevétel bőséges folyadékkal történjen. Orvosnak kell döntenie a gyógyszer tartós alkalmazásáról.

Mit tegyünk, ha túl sokat vettünk be ebből a gyógyszerből?

A túladagolás következtében kialakuló toxikus hatások kockázata igen kicsi.

Milyen nemkívánatos hatásai lehetnek ennek a gyógyszernek?

A mellékhatások vagy szövődmények megjelenésének kockázata igen kicsi, még akkor is, ha a Mezým® forte 10000 tablettá szedése hasnyálmirigy működési zavarok miatt hosszú ideig történik. Kivételes esetben allergiás reakció előfordulását leírták pankreatin szedésekor. Leírták ritkán az alsó bélszakasz szűkületét egy-egy cysticus fibrosisban szenvedő betegen magas dóziszú pankreatin szedése után. A székrekedés vagy a belek elzáródása a hasnyálmirigy cysticus fibrosisának ismert szövődménye. Ha elzáródás-szerű tünetek fordulnának elő, a belek szűkületére is gondolni kell.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A gyógyszer a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T-9078/01-04

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 4206/40/2003

A forgalombahozatali engedély jogosultja:



BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Berlin, Németország