



# Reparon<sup>®</sup>

kenőcs

## Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.

Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.

## A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejti ki hatását a Reparon kenőcs?
2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a kenőcsöt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

## Reparon<sup>®</sup> kenőcs

*Hatóanyag:* 330,4 millió *Vaccina E. coli* (steril) – 1 g kenőcsben.

*Segédanyagok:* fenol, fehér viasz, gyapjúviasz, tisztított víz, sárga vazelin.

*Leírás:* sárgásfehér színű, szagtalan, homogén olajos kenőcs.

*Csomagolás:* 25 g kenőcs epoxi-fenol védőlakkkal bevont alumíniumtubusba töltve és fehér PE-kupakkal lezárva. Egy tubus egy dobozban.

## Gyártó és a forgalombahozatali engedély jogosultja:



EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.  
MAGYARORSZÁG • BUDAPEST

## 1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejti ki hatását a Reparon kenőcs?

A Reparon kenőcs hatóanyagként előlt baktériumkultúra-szuszpenziót (fenollal előlt *Eschericia coli* baktérium alakos elemeit és anyagcseretermékeit) tartalmaz. A baktériumkultúra-szuszpenzió a bőrre és nyálkahártyára való felvitele után specifikus és nem specifikus immunválaszt vált ki, fokozza az érintett szövetek természetes védekezőképességét, gyulladáscsökkentő hatású és elősegíti a sebgyógyulást. A Reparon kenőcs aranyér és szövödményeinek, mint pl. fájdalom, viszketés, gyulladás, ekcéma, végbélnyílás környékének berepedése, kezelésére szolgál.

## 2. Tudnivalók a készítmény alkalmazása előtt

### **Ne alkalmazza a készítményt:**

- ha túlérzékeny a készítmény hatóanyagára vagy bármely segédanyagára.

### **Terhesség, szoptatás**

Terhesség és szoptatás idején alkalmazott Reparon kenőcsre vonatkozó vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre. Mivel a készítményben konzerváló anyagként használt fenol koncentrációja jóval alatta marad a gyakorlatban korábban használt fenololdatok koncentrációjának, nem várható, hogy terhesség és szoptatás idején az anya és gyermeke biztonságát veszélyeztetné.

Terhesség és szoptatás idején minden gyógyszer használata előtt kérje ki orvosa tanácsát!





## **A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

Várhatóan nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és baleseti veszéllyel járó munka végzéséhez szükséges képességeket.

### **A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek:**

- Ha betartja a kenőcs alkalmazására vonatkozó előírásokat, egyéb gyógyszerekkel való gyógyszerkölsönhatásra gyakorlatilag nem kell számítani.
- A kenőcs és kondom egyidejű használata a kondom általi védekezés biztonságosságát csökkentheti.

### **3. Hogyan kell alkalmazni a kenőcsöt?**

A Reparon kenőcs külső használatra szolgál.

Ha az orvos másként nem rendeli, székelés és ülőfürdő után a végbél környékét be kell kenni, ill. a tubusra szerelhető toldalék segítségével babnyi kenőcsöt a végbélbe nyomni. Használat után a tubust a védősapkával jól le kell zárni.

- A kenőcs szembe, szem környékére, szájba, szájnyálkahártyára ne kerüljön! A kezelendő terület bekenése után mindig mosson kezet, és ha használata közben mégis az említett területekre jutott a kenőcs, vízzel távolítsa el.
- A kenőcs hatására előfordulhat a fehérmű elszíneződése, ezért valamilyen betét alkalmazása ajánlott.

### **Ha az előírtnál több kenőcsöt alkalmazott:**

Mivel a hatóanyagot a végbélnyílás környéki bőrön és nyálkahártyán kell alkalmazni, előírás szerinti használatokor a túlادagolás esélye elhanyagolható. A kenőcs konzerváló anyagként kb. 0,02%-ban tartalmaz fenolt, így a jóval töményebb fenololdatok alkalmazása mellett leírt szövetkárosító hatásos (környéki idegek pusztulása, ekcéma, szövetelhalás) előfordulása még túlادagolás esetén sem várható. Véletlenszerű szájon át történő bevétel esetén (pl. gyermekeknél) előfordulhatnak gyomor-, bélrendszeri panaszok (hasfájás, hányinger). Túlادagolás vagy annak gyanúja esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz!

### **Ha adagját elfelejtette alkalmazni:**

Következő alkalommal ne alkalmazzon dupla adagot.

Folytassa a kezelést az előírtak szerint.

### **4. Lehetséges mellékhatások**

Mint minden gyógyszernek, a Reparon kenőcsnek is lehetnek mellékhatásai. A készítmény az alkalmazás helyén átmeneti kivörösödést, viszketést, hámlást okozhat. Ha ilyen tüneteket észlel, hagyja abba a kenőcs használatát és forduljon orvoshoz.

Nagyon ritkán túlérzékenységi (allergiás) reakció is előfordulhat (pl. a készítményben konzerváló szerként használt fenollal szemben). Csalánkiütés jelentkezése esetén a gyógyszer alkalmazását feltétlenül hagyja abba és a további teendőket beszélje meg orvosával. Ha a kiütések intenzíven, testszerte jelentkeznek, az esetleges súlyos tünetek megelőzése érdekében forduljon azonnal orvoshoz!

A Reparon kenőcs előírás szerinti használata mellett egyéb mellékhatással nem kell számolni.

Ha az itt felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb szokatlan tünetet észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

### **5. Tárolás**

5–15 °C között, száraz helyen tárolandó.

A készítmény csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel.

### **A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.**

OGYI-T-9005/01

Betegájékoztató OGYI-eng. száma: 30.648/55/2003

EGIS dok. szám: 14567

