



BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

COLDREX MaxGrip citrom ízű por forróitalhoz

paracetamol • fenilefrin-hidroklorid • aszkorbinsav (C-vitamin)

Mielőtt elkezdéné gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót!

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez!
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei egy hét múlva sem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a **Coldrex MaxGrip** citrom ízű por és milyen betegségeknél alkalmazható?
2. Tudnivalók a **Coldrex MaxGrip** citrom ízű por alkalmazása előtt.
3. Hogyan kell alkalmazni a **Coldrex MaxGrip** citrom ízű port?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a **Coldrex MaxGrip** citrom ízű port tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A COLDREX MAXGRIP CITROM ÍZŰ POR ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A **Coldrex MaxGrip** citrom ízű por a megfázás és influenza tüneteinek enyhítésére szolgál. Három hatóanyagot tartalmaz:

- **paracetamol**: mely fájdalom- és lázcillapító hatással rendelkezik,
- **fenilefrin-hidroklorid**: mely szabaddá teszi a náthásan eldugult orrot illetve az orrmelléküregeket és könnyíti a légzést,
- **C-vitamint (aszkorbinsav)**: a megfázás és influenza kezdeti szakaszában fellépő C-vitamin veszteség pótlásában segít.

2. TUDNIVALÓK A COLDREX MAXGRIP CITROM ÍZŰ POR ALKALMAZÁSA ELŐTT

A **Coldrex MaxGrip** citrom ízű por **paracetamol** és az **orrdugulás csökkentésére** szolgáló hatóanyagot tartalmaz.

- ! Ezért, ne alkalmazza egyéb paracetamol-tartalmú, vagy a megfázás és influenza kezelésére szolgáló más készítményekkel együtt!**

Ne alkalmazza a Coldrex MaxGrip citrom ízű port

- Ha **allergiás** (túlérzékeny) a paracetamolra, a C-vitaminra, a fenilefrin-hidrokloridra, vagy a készítmény bármely más összetevőjére.
- Ha **máj-, vagy vesebetegsége** van.
- Ha **pajzsmirigy túlműködése** van.
- Ha **szívbetegségben** szenved.
- Ha **cukorbeteg**.
- Ha **enzimhiányos** betegségben szenved (un. glükóz-6-foszfát-dehidrogenáz enzim hiány).
- **12 évesnél fiatalabb gyermekek esetében.**
- Az **egyéb gyógyszereket** is szed (további információért lásd „A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek”).
- Ha bizonyos **cukrokra érzékeny**.

Beszélgjen orvosával, ha a felsoroltak bármelyike igaz Önre.

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek

Ne alkalmazza:

- Más **paracetamol-tartalmú** gyógyszerekkel együtt.
- Az **orrdugulás csökkentésére** vagy a megfázás kezelésére szolgáló más gyógyszerekkel együtt.
- Ha **depresszió** kezelésére szolgáló gyógyszereket pl. monoaminooxidáz gátló szereket szed vagy szedett az elmúlt két hétben.
- **Szívproblémák és magas vérnyomás** kezelésére szolgáló ún. **béta-blokkoló** gyógyszereket szed.

Beszélgjen orvosával a Coldrex MaxGrip citrom ízű por alkalmazása előtt:

- ha kloramfenikol vagy doxorubicin tartalmú gyógyszert szed.
- ha véralvadásgátlót (warfarin) szed.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható gyógyszereket és a gyógynövény-tartalmú készítményeket is.

Terhesség és szoptatás

Amennyiben terhes, vagy szoptat, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beleértve a **Coldrex MaxGrip** citrom ízű port is!

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

A **Coldrex MaxGrip** citrom ízű por nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességeket.

COLDREX MaxGrip citrom ízű por forróitalhoz

Fontos információk a Coldrex MaxGrip citrom ízű por egyes összetevőiről

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdí alkalmazni ezt a gyógyszert.

A készítmény 0,12 g nátriumot tartalmaz tasakonként, amit kontrollált nátrium diéta esetén figyelembe kell venni.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A COLDREX MAXGRIP CITROM ÍZŰ PORT?

Ne adjon Coldrex MaxGrip citrom ízű forróitalt 12 évesnél fiatalabb gyermekeknek.

Kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét ha nem biztos abban, hogy adhatja-e ezt a gyógyszert gyermekének!

A szokásos adag 12 éves kortól 4-6 óránként 1 tasak. 24 órán belül 4 adagnál többet ne alkalmazzon.

A Coldrex MaxGrip citrom ízű porból készítsen meleg italt és ígya meg:

1. Öntse a tasak tartalmát egy bögrébe, majd töltsön hozzá forró vizet és jól keverje össze.

2. Ha szükséges, adjon hozzá hideg vizet.

3. Izesítse cukorral, vagy mézzel ahogy szereti.

Ha a tünetek egy hét múlva sem enyhülnek:

• **Menjen el kezelőorvosához,** és hagyja abba a **Coldrex MaxGrip** citrom ízű por alkalmazását.

Ha az előírtnál több Coldrex MaxGrip citrom ízű forróitalt alkalmazott

• **Azonnal forduljon orvoshoz.** Orvosa elmondja majd Önnek, hogy mit kell tennie.

Fontos, hogy beszéljen orvosával, még akkor is ha jól érzi magát. Ha valaki túl sok paracetamolt vett be, fennáll a veszélye egy későbbi, súlyos májkárosodás kialakulásának.

Ha elfelejtette alkalmazni a Coldrex MaxGrip citrom ízű port

Vegye be a szükséges adagot, amikor eszébe jut. 4 óránként egy adagnál többet ne vegyen be. **Ne alkalmazzon dupla adagot az elfelejtett adag pótlására.**

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a **Coldrex MaxGrip** citrom ízű por is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Ritkán, az alábbi mellékhatások fordulhatnak elő:

- bőrkirritás és egyéb allergiás bőrreakciók,
- vérnyomásemelkedés,
- fejfájás,
- szédülés,
- hányinger, hányás, hasmenés,
- alvási nehézség,
- szívdobogásérzés.

Ha bármelyik mellékhatás jelentkezik illetve súlyossá válik, vagy ha a **betegájékoztatóban** felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, **kérjük értesítse kezelőorvosát vagy gyógyszerészét** és ne alkalmazzon több **Coldrex MaxGrip** citrom ízű forróitalt!

5. HOGYAN KELL A COLDREX MAXGRIP CITROM ÍZŰ PORT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne alkalmazzon a **Coldrex MaxGrip** citrom ízű port. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékokkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Coldrex MaxGrip citrom ízű por forróitalhoz

A **Coldrex MaxGrip** citrom ízű por hatóanyagai a paracetamol, fenilefrin-hidroklorid és az aszkorbinsav (C-vitamin). Minden tasak 6,4 g port tartalmaz, amelyben 1000 mg paracetamol, 10 mg fenilefrin-hidroklorid és 40 mg aszkorbinsav van. Egyéb összetevők: kolloid szilícium-dioxid, kurkumin (E100), szacharimid-nátrium, nátrium-ciklamát, citrom aroma, kukoricakeményítő, trinátrium-citrát, vízmentes citromsav, szacharóz (cukor).

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

A **Coldrex MaxGrip** citrom ízű por halványárga színű, citrom ízű és illatú por. 5 vagy 10 tasakot tartalmazó dobozokban kapható.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Limited, Brentford TW8 9GS, Egyesült Királyság

Gyártó: SmithKline Beecham S.A., 28.806 Alcalá de Henares Madrid, Spanyolország

A forgalomba hozatali engedély jogosultjának magyarországi képviselője:

GlaxoSmithKline Kft., Consumer Healthcare
1124 Budapest
Csőrsz u. 43.

OGYI-T-9100/01-02

A betegájékoztató engedélyezésének dátuma: 2007. június 2.

11000000000321

L607089/02