

Sedacur forte bevont tabletta

macskagyökér száraz kivonat, citromfű száraz kivonat, komló toboz száraz kivonat.

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

- Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindamelllett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.
- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei két héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Sedacur forte bevont tabletta (továbbiakban Sedacur forte) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Sedacur forte szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Sedacur forte bevont tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Sedacur forte bevont tablettát tárolni?
6. További információk.

1. Milyen típusú gyógyszer a Sedacur forte és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Alkalmazása nyugtalanság és idegi eredetű alvászavar kezelésére javasolt.

A Sedacur forte olyan gyógyszer, melyet gyógynövény kivonatokból állítottak össze. A gyógyszer valeriana gyökeret, komlótoぼzot és citromfű levelet tartalmaz. Ezek a gyógynövények igazoltan olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek átmenetileg alkalmazhatók elalvási problémák és nyugtalanság kezelésére. A túlzott stressz koncentrációs nehézségekre, a megfigyelőkészség zavarára, kimerülésre, idegességre/ingerlékenységre hajlamosít és a belső nyugtalanság érzése elalvási nehézségeket is okozhat.

Kiegyensúlyozott hatóanyagtartalma miatt a Sedacur forte napközben történő alkalmazása nyugtató hatású. A Sedacur forte esti, a lefekvést megelőző bevétel esetén elősegíti az elalvást és nyugodt, pihentető alvást biztosít.

2. Tudnivalók a Sedacur forte szedése előtt

Ne alkalmazza a készítményt:

Ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a Sedacur forte egyéb összetevőire

A Sedacur forte fokozott elővigyázatossággal alkalmazható

Ha a tünetek két hét elmúltával sem javulnak, sőt rosszabbodnak, akkor feltétlenül keresse fel kezelőorvosát.

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

Jelen ismereteink szerint más gyógyszer szedése nem befolyásolja a Sedacur forte alkalmazását.

A Sedacur forte bevétele bizonyos ételekkel vagy italokkal

Alkohol fogyasztása nem befolyásolja a hatását.

Terhesség és szoptatás:

Mivel terhesség és szoptatás alatt történő alkalmazására vonatkozó adat nem ismert, használata ezen állapotokban nem javasolt.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítménnyel folytatott placebo kontrollos tolerancia vizsgálat szerint a készítmény nem befolyásolja a koncentrációképességet, a motoros koordinációt, reakcióképességet, éberséget, felfogó és érzékelő képességet.

Fontos információk a Sedacur forte egyes összetevőiről

A készítmény 121,558 mg szacharózt (egy fajta cukrot) tartalmaz bevont tablettánként

Ha kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, akkor kérdezze meg kezelőorvosát, mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert.

3. Hogyan kell alkalmazni a Sedacur forte bevont tablettát?

Az alábbi adagolási módot kell követni, kivéve, ha az orvos másképp rendeli. A megfelelő hatás érdekében kérjük, pontosan tartsa be az adagolási előírásokat.

Naponta két-három alkalommal vegyen be 1 vagy 2 tablettát, ez napi 2 – 6 tablettának felel meg.

A tablettákat szétrágás nélkül vegye be kevés folyadékkal reggel és este, vagy reggel-délben-este.

Ha altatóként szeretné használni, lefekvés előtt 1 órával vegyen be 1 vagy 2 tablettát.

A kezelés időtartama a betegség típusától és súlyosságától függ.

Ha az előírtnál több Sedacur forte-t vett be:

Amennyiben az előírtnál több tablettát vett be, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ha elfelejtette bevenni az adagját:

Amennyiben elfelejtette bevenni a gyógyszert, vegye be a javasolt adagot, minél hamarabb, de ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tablettá pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Ritkán gyomor-bélrendszeri panaszok.

Nagyon ritkán allergiás bőrkütiés jelentkezhet.

A mellékhatások megszűnéséhez általában elegendő a gyógyszer szedésének abbahagyása.

Túlérzékenységre utaló első tünetek megjelenésekor a gyógyszer szedését abba kell hagyni.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A SEDACUR FORTE BEVONT TABLETTÁT TÁROLNI?

Legfeljebb 30°C-on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne szedje a Sedacur forte bevont tablettát. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Sedacur forte bevont tablettá?

Hatóanyag: 75,0 mg macskagyökér száraz kivonat, 45 mg citromfű száraz kivonat, 23 mg komló toboz száraz kivonat bevont tablettánként.

Egyéb összetevők:

maltodextrin, mikrokristályos cellulóz, kopovidon, povidon, vízmentes kolloid szilícium-dioxid, sztearinsav, talkum, karmellóz-nátrium, karnauba viasz, fehér viasz, porlasztva szárított glükóz szirup, indigotin E132, kukoricakeményítő, szacharóz, sellak, titán-dioxid E171, poliszorbát 80

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Küllem: Halványkék, sima, fényes, domború felületű, kerek bevont tablettá.

Csomagolás:

Bevont tabletták PVC/PVDC//Al buborékfóliában és dobozban.

30 db, 50 db vagy 100 db bevont tablettá

A forgalomba hozatali engedély jogosultja

Phytotec Hungária Bt. 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 61.

Gyártó:

Schaper & Brümmer GmbH & Co. KG, Salzgitter, Németország

OGYI-T-9504/01 (30 db)

OGYI-T-9504/02 (50 db)

OGYI-T-9504/03 (100 db)

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma

2009. 09. 25.