

Cetirizin HEXAL® 10 mg filmtabletta Cetirizin HEXAL® 10 mg/ml cseppek

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót!

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!

További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez!

E gyógyszert az orvos személyesen Önnek írta fel. A készítményt másoknak átadni nem szabad, mert számukra ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tünetei az Önéhez hasonlóak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejti ki hatását a Cetirizin HEXAL filmtabletta és cseppek?
2. Tudnivalók a Cetirizin Hexal filmtabletta és cseppek alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Cetirizin Hexal filmtablettát és cseppeket?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a készítmény?

Hatóanyagok:

Filmtabletta:

10 mg cetirizini dihydrochloridum (cetirizin-dihidroklorid) (megfelel 8,42 mg cetirizinum (cetirizin)-nak) filmtablettánként.

Cseppek:

10 mg cetirizini dihydrochloridum (cetirizin-dihidroklorid) (megfelel 8,42 mg cetirizinum (cetirizin)-nak) milliliterenként.

Segédanyagok:

Filmtabletta

Magnézium-sztearát, koloid vízmentes szilícium-dioxid, mikrokristályos-cellulóz, laktóz-monohidrát, „Opadry white” színkeverék (makrogol 4000, titán-dioxid E171, hipromellóz, laktóz-monohidrát).

Cseppek

Nátrium-acetát-trihidrát, propilénglikol, 85%-os glicerín, tisztított víz, benzooesav.

Csomagolás:

Filmtabletta: 30 db filmtabletta bliszter és falkartonban

Cseppek: 1 x 20 ml üveg falkartonban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

HEXAL Hungária Kft

Gyártó:

HEXAL AG., Germany

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejti ki hatását a Cetirizin Hexal filmtabletta és cseppek?

A cetirizin az antihisztaminok csoportjába tartozik. Az antihisztaminok a szervezetben a hisztamin felszabadulás okozta túlérzékenységi reakciókat csökkentik.

Javallatok:

allergiás nátha (rhinitis), mind a szezonális, mind az évszaktól független, allergiás kötőhártya-gyulladás, csalánkiütés és viszketőség, allergiás eredetű tünetek.

2. Tudnivalók a Cetirizin Hexal filmtabletta és cseppek alkalmazása előtt

Ne szedje a tablettát:

Amennyiben túlérzékenységi túlérzékeny a készítmény bármely összetevőjével.

Terhesség, szoptatás ideje alatt.

2 éves életkor alatt.

Egyedi orvosi elbírálás alapján adható:

vesebetegségben

Figyelmeztetések

Cetirizinnel való hosszú idejű kezelés a szájszárazság miatt néhány betegnél megnövelheti a fogszuvasodás kockázatát. A betegeket ezért tájékoztatni kell a megfelelő szájhigiéne fontosságáról.

Tejcukor érzékenységekben figyelembe kell venni, hogy a filmtabletta 81,8mg tejcukrot is tartalmaz filmtablettánként.

Terhesség, szoptatás

Amennyiben Ön terhes vagy szoptat, erről tájékoztassa orvosát. A készítmény terhesség és szoptatás ideje alatt nem szedhető!

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítmény szédülést, fejfájást, álmoságot okozhat. A kezelőorvos egyedileg határozza meg a közlekedésben való részvételre és a baleseti veszéllyel járó munkavégzésre vonatkozó korlátozást vagy tilalmat.

Szedhet-e egyéb gyógyszert a Cetirizin Hexal készítményekkel egy időben?

Kölcsönhatások más gyógyszerekkel nem ismeretek.

Ha az Ön bőrén allergiatesztet végeznek, a Cetirizin Hexal szedését 3 nappal előtte abba kell hagyni.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A CETIRIZIN HEXAL FILMTABLETTÁT ÉS CSEPPEKET?

Tartsa be az előírt adagolást, mert ellenkező esetben a Cetirizin Hexal nem hat megfelelően.

Amennyiben az orvos másképp nem rendeli, szokásos adagja:
Filmtabletta

Felnőttek és 12 évnél idősebb gyermekek:
Naponta 1 tabletta.

6-12 éves gyermekek:
Naponta kétszer ½ filmtabletta vagy naponta 1 filmtabletta.

2-6 éves gyermekek:
Naponta egyszer 5 mg cetirizin (fél tablettának megfelelő adag).

A gyermek korától és az adagtól függően cseppek adása orálisan előnyösebb lehet, mint a filmtablettáé.

Cseppek
Felnőttek és 12 évnél idősebb gyerekek:
10 mg (20 csepp) naponta.

6 – 12 éves gyermekek:
10 mg (20 csepp) naponta egyszer vagy 5 mg (10 csepp) naponta kétszer.

2 – 6 éves gyermekek:
5 mg (10 csepp) naponta egyszer vagy 2,5 mg (5 csepp) naponta kétszer.

Adagolás veseelégtelenségben
Veseelégtelenségben az adagot a szokásos napi adag felére kell csökkenteni.

Hogyan és mikor vegye be a Cetirizin Hexalt?

A filmtablettát elegendő mennyiségű folyadékkal ajánlott bevenni.
A cseppeket gyümölcslével vagy vízzel kell keverni közvetlenül a bevétel előtt.

Mennyi ideig szedje a Cetirizin Hexalt?

A kezelés időtartamát az orvos határozza meg a tünetek természetétől, tartósságától és lefolyásától függően.

Túladagolás és adagolási hibák

Mit kell tennie, ha túl sok Cetirizin Hexalt vett be (szándékos vagy téves túladagolás)?

Ha túl sok Cetirizin Hexalt vett be, s a túladagolás tünetei mutatkoznak, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét!

Túladagolással kapcsolatban korlátozott számú tapasztalat áll rendelkezésre.
Súlyos mérgezési eseteket eddig nem tapasztaltak.

A következő túladagolási tüneteket találták antihisztamin túladagolásával kapcsolatban:
fáradékonyság, gyerekeknél izgatottság léphet fel.

Kezelés
Speciális ellenszer nem ismeretes. Egyszeri nagy adagnál csak a szokásos tüneti ellátás, gyomormosás javasolt.

Mire kell ügyelnie, ha túl kevés Cetirizin Hexalt vett be, vagy egy adagot elfelejtett bevenni?

Ha egyszer elfelejtette gyógyszerét bevenni, vegye azt be, amint lehetséges. Ezután az előírás szerinti adagolást alkalmazza.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Ha olyan mellékhatásokat észlel, melyek nincsenek az alábbiakban felsorolva, kérjük értesítse erről orvosát, gyógyszerészét!

A következő nemkívánatos hatások léphetnek fel:

Szájszárazság, fejfájás, szédülés, álomosság, izgatottság és gyomorpanaszok.
Ritkán túlérzékenységi tüneteket, mint pl. bőrkiütést és nyálkahártya vizenyőt észleltek.

Átmeneti és enyhe szubjektív fáradtság előfordult. Bár az ajánlott adag szedése mellett a pszichomotoros teljesítményt mérő objektív vizsgálatok nem igazolták a figyelem és a reakcióidő módosulására tett hatását.

5. TÁROLÁS

Filmtabletta:
Különleges tárolást nem igényel.
Cseppek:
Különleges tárolást nem igényel.
Felbontás után: 6 hónap (legfeljebb 25°C-on tárolva.)

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

OGYI-T-9101/01 Cetirizin Hexal 10 mg filmtabletta (30 db)
OGYI-T-9102/01 Cetirizin Hexal 10,0 mg/ml cseppek (20 ml)

Betegtájékoztató OGYI eng.száma: 21.619/40/2003