

EUROVIT[®]



C-vitamin 100 mg rágótabletta

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót!

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.

Milyen típusú gyógyszer az EUROVIT[®] C-vitamin rágótabletta?

Az EUROVIT C-vitamin rágótabletta C-vitamin-hiány megelőzésére és kezelésére szolgáló készítmény.

Kerek, narancssárga színű, illatú és ízű, mindkét oldalán domború felületű tabletták. 30, illetve 60 db tablettát tartalmazó tartályban, valamint dobozban kerül forgalomba.

Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz az EUROVIT[®] C-vitamin rágótabletta?

Hatóanyag: 40 mg aszkorbinsav és 70 mg nátrium-aszkorbát (az aszkorbinsav nátriumsója) rágótablettánként

Segédanyagok: „Sunset yellow” Al-lakk (E 110), narancsaroma, vízmentes kolloid szilícium-dioxid, sztearinsav, nátrium-ciklamát, mikrokrisztályos cellulóz, „Cantab” (dextrátok)

Milyen betegségek kezelésére alkalmas az EUROVIT[®] C-vitamin rágótabletta?

C-vitamin-hiány (skorbut), illetve Möller-Barlow betegség (vérzésekkel és angolkórra jellemző csontelváltozással járó skorbut kisgyermekekben) megelőzésére és kezelésére. Fertőző betegségekben a szervezet ellenálló képességét fokozza. Hatékony fáradékonyság esetén, hűléses megbetegedésekben, valamint legyengült vagy betegség utáni lábadozó időszakban. Megnövekedett vitaminszükséglet (terhesség, szoptatás, idős kor stb.), valamint elégtelen C-vitamin-bevitel vagy csökkent felszívódás (gyomorfekély, vastagbélgyulladás, vérhas stb.) esetén hatásos. Hatékony a különböző vérzések esetén [vérvizelés, vérköpés, vérékenységek, retina (szemideghártya) vérzés, vérzésre való hajlam]. létfontosságú a porcfelszín, a csont és a fog fejlődéséhez. Alkalmas a fog- és csontszuvasodás, foggyógybetegség kezelésére. Javasolt nyálkahártya- és fogínyvérzés esetén.

Mikor nem szabad alkalmazni a gyógyszert?

A készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén, illetve ha a kórelőzményben vesekőbetegség szerepel.



Hogyan kell szedni a gyógyszert?

Felnőtteknek: a minimális adag kb. 30 mg, a napi átlagos szükséglet 100-500 mg reggel, ill. reggel és este, a maximális adag 1000 mg/nap.

Gyermekeknek: minimális adag 5 mg testtömeg-kilogrammonként, a napi átlagos szükséglet 50-200 mg reggel, ill. reggel és este.

Nagyobb adagokra serdülőkorban, terhességben, szoptatás ideje alatt, fertőzésekben és műtéti beavatkozást követő időszakban lehet szükség.

A tablettát szétrágva vagy elszopogatva kell bevenni, ezt követően a száját alaposan ki kell öblíteni a fogszuvasodás megelőzésére.

Szedése során milyen mellékhatások fordulhatnak elő?

Nagy dózisu, általában 1000 mg feletti aszkorbinsav hosszú ideig történő alkalmazásának leggyakoribb mellékhatása a hasmenés, gyomor- és bélpanaszok. A vizeletet megsavanyítva a húgyutakban urát-, oxalát- vagy cisztinkövek képződhetnek. Vesekőképződés veszélye különösen azon betegek esetében áll fenn, akiknek a kórelőzményében veseköves megbetegedés szerepel, ill. daganatos betegségekben szenvednek.

Mire kell ügyelni, amennyiben más gyógyszert is szed?

Óvatosan adható együtt a következő hatóanyag-tartalmú gyógyszerekkel:

- primidonnal
- deferoxaminnal
- diszulfirámmal
- mexiletinnel (gyorsíthatja a mexiletin-kiválasztódást)
- szalicilátokkal

Nagy adag aszkorbinsav csökkenti a vizelet pH-ját, amely a savas karakterű hatóanyagok újfelfelvételét eredményezheti.

Mire kell még figyelni alkalmazása során?

Szedése nagyobb adagban zavarhatja a vizeletcukor- és egyéb laboratóriumi értékek meghatározását. Cukortartalom 100 mg-os tablettában: 0,20 g

Hogyan kell a gyógyszert tárolni?

Szobahőmérsékleten, 15–25 °C között, fénytől védve, eredeti csomagolásban.

A gyógyszert kizárólag a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni. A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

TEVA Gyógyszergyár Részvénytársaság, Debrecen

OGYI-T-9737/01-02