

NATURLAND®

Tabletta Coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi beteg-tájékoztatót.

- ♦ *E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múlt panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.*
- ♦ *Tartsa meg a beteg-tájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- ♦ *További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.*
- ♦ *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.*

A beteg-tájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer és milyen betegségek esetén alkalmazható a Tabletta Coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland?
2. Tudnivalók a Tabletta Coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland alkalmazása előtt.
3. Hogyan kell alkalmazni a Tabletta Coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland-ot?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

A készítmény hatóanyaga: 100,0 mg koffein tablettánként.

Egyéb összetevők: kukoricakeményítő, fehér zselatin, magnézium-sztearát.

Gyártó és a forgalombahozatali engedély jogosultja:

NATURLAND Magyarország Kft.

1106 Budapest, Csillagvirág u. 8.

1. Milyen típusú gyógyszer és milyen betegségek esetén alkalmazható a Tabletta Coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland?

A Tabletta Coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland a központi idegrendszerre ható gyógyszer-készítmény, amely az idegrendszer fáradékonyságával járó állapotokban javítja a szellemi működéseket (megfigyelés, ítéletalkotás, eszmetársítás), csökkenti a fáradtságot és az álmoságot. A központi idegrendszerre kifejtett hatása mellett növeli az izmok teljesítőképességét ezért alkalmazható általános kimerültség, gyengeség esetén.

A fentiekben kívül terápiás jelentősége van az alkoholmérgezés, fenyegető légzésbénulás, álló helyzet által kiváltott alacsony vérnyomás kezelésében is.

2. Tudnivalók a Tabletta Coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland alkalmazása előtt.

Nem szabad a készítményt alkalmazni

A készítmény alkalmazását kerülni kell, nyelőcső gyulladás, gyomor-, bélrendszeri fekély, illetve az összetevőkkel szembeni ismert túlérzékenység (allergia) esetén.

Terhesség, szoptatás

Terhesség időszakában a készítmény hatékonysága és megbízhatósága nem ismert. A szoptató anyáknak a készítmény óvatosan adható, mivel a koffein kis mértékben bejut az anyatejbe.

NATURLAND®

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

Nem befolyásolja hátrányosan az ezekhez szükséges képességeket.

Fokozott elővigyázatossággal alkalmazható:

Óvatosan adható magas vérnyomás, szabálytalan szívverés, szívizombántalom, heveny bal szívfél elégtelenség, a pajzsmirigy fokozott működése, súlyos májkárosodás, valamint kisgyermekek, idősek és leromlott állapotú egyének esetében.

Egyéb gyógyszerek alkalmazása

Más gyógyszerekkel történő együtt alkalmazása előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét, mivel:

- a koffein növeli a májon át lebomló gyógyszerek vérszintjét
- a nem-kábító fájdalomcsillapítók, az ergotamin hatását a koffein fokozza
- a meprobamat és izoniazid tartalmú készítmények a koffein hatását fokozzák
- a cimetidin a koffein vérszintjét növeli

3. Hogyan kell alkalmazni a Tabletta Coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland-ot?

Amennyiben az orvos másképpen nem rendeli a készítmény szokásos adagja reggel és délben 1-2 tableta, amelyet kevés folyadékkal, szétrágás nélkül kell bevenni.

Ha az előírtnál több Tabletta Coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland-ot alkalmazott

A készítmény túladagolása során izgatottság, remegés, szívritmuszavarok, fülzúgás, látótérkiesés jelentkezhetnek.

Amennyiben a túladagolásból eredő tüneteket észleli azonnal forduljon orvoshoz!

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszernek, a Tabletta Coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland-nak is lehetnek mellékhatásai.

A Tabletta Coffeini 100 mg FoNo VII. Naturland-ot nagy dózisban alkalmazva szapora szívverés, szív működési zavarok esetén korai szívizom összehúzódás alakulhat ki. A készítmény a gyomor, és bélnyálkahártyát irritálja, hányinger, hasmenés, központi idegrendszeri tünetek, remegés jelentkezhet. Csökkent májműködésnél a koffein felezési ideje megnyúlhat, ami túladagolási tünetekhez vezethet. Esti bevétele az alvást zavarhatja.

Az előbb említett mellékhatások vagy bármely szokatlan tünet jelentkezése esetén hagyja abba a készítmény szedését és tájékoztassa kezelőorvosát!

5. Tárolás

Legfeljebb 25 °C-on, fénytől védve tárolandó.

A terméket csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Csomagolási egység: 20 db tableta / doboz

OGYI-T-9886/01

Betegtájékoztató OGYI eng. száma: 20778/40/2004