



Canesten® PLUS

Bifonazol SPRAY

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Canesten Plus és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Canesten Plus alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Canesten Plus?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás
6. További információk

Canesten Plus bifonazol spray

A készítmény hatóanyaga:

1 ml Canesten Plus bifonazol spray 0,01 g bifonazolt tartalmaz.
Egyéb összetevők: 96%-os etanol, izopropil-mirisztát.

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer Hungária Kft.

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CANESTEN PLUS ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Bőr fertőzést okozó gombák (Dermatophyták), élesztőgombák, penészgombák és egyéb gombák (pl. Malassezia furfur) által okozott gombás bőrfertőzések, továbbá a Corynebacterium minutissimum nevű baktérium okozta bőrfertőzés (erythrasma) kezelésére.

Gombás fertőzések gyakorlatilag a test minden részén előfordulhatnak.

A Canesten Plus bifonazol spray alkalmazható a láb, kéz, test és testhajlatok gombás fertőzéseinek kezelésére, továbbá színes hámló bőrfelület és felszíni gombás fertőzés (kandidiázis) esetén.

2. TUDNIVALÓK A CANESTEN PLUS ALKALMAZÁSA ELŐTT

Nem alkalmazhatja a Canesten Plus bifonazol sprayt:

- ha Ön a hatóanyaggal és/vagy a készítmény bármely összetevőjével szemben túlérzékeny.

Fontos információk:

- A Canesten Plus bifonazol spray nem kerülhet a szembe!
- Csecsemőknek csak orvosi felügyelet mellett szabad alkalmazni.
- A Canesten Plus bifonazol sprayt nem szabad nyílt lángba vagy izzó tárgyra permetezni. Alkalmazása közben dohányzás és nyílt láng használata tilos.
A készítmény alkoholtartalma miatt gyúlékony.
- Az érintett bőrterületet minden kezelés előtt gondosan le kell mosni és utána alaposan meg kell szárítani.
- Naponta cserélni kell a törölközőt és a kezelt bőrterülettel érintkező ruházatot.

Terhesség Szoptatás

Terhesség és szoptatás időszakában kerülni kell a Canesten Plus bifonazol spray alkalmazását.

Amennyiben szoptatás időszakában elkerülhetetlen az alkalmazása, a mell területén nem szabad alkalmazni.

Egyéb gyógyszerek

Nem ismertek.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

Nem ismert ilyen hatás.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A CANESTEN PLUS-t?

A Canesten Plus bifonazol sprayt naponta egyszer kell alkalmazni, lehetőleg este, lefekvés előtt. Az érintett bőrterületet a készítménnyel vékony rétegben be kell permetezni majd be kell dörzsölni.

A spray kis mennyisége (a porlasztófej 1–2 -szeri lenyomásával) általában elegendő egy tenyérnyi nagyságú terület kezelésére.

Kezelés időtartama:

A tartós gyógyulás érdekében a kezelést a tünetek megszűnése után is folytatni kell. Ha az orvos másképp nem rendel, a szokásos kezelési időtartamok a fertőzés típusától függően:

- láb és lábujjak közötti gombásodás: 3 hét,
- törzs, kéz és bőrredők gombásodása: 2-3 hét,
- színes hámló bőrfelület, (erythrasma): 2 hét,
- bőr felszíni gombás fertőzése (kandidiázis): 2-4 hét.

Értesítse kezelőorvosát, amennyiben:

- **tünetei 1 héten belül nem javulnak, vagy rosszabbodnak,**
- **a kezelés hatását túl erősnek, vagy túl gyengének tartja.**

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek Canesten Plus bifonazol spray-nek is lehetnek mellékhatásai.

A Canesten Plus bifonazol spray alkalmazását követően az alábbi mellékhatásokat figyelték meg.

Bőr: az előfordulás gyakorisága $\geq 0,1\%$ - $< 1\%$:

Átmeneti bőrreakciók, mint pl. kontakt bőrgyulladás, (dermatitis), hólyagképződéssel járó kiütés, égő érzés, bőrvizsketés.

Túlérzékenységi reakciók: az előfordulás gyakorisága $\geq 0,01\%$ - $< 0,1\%$:
hatóanyag, vagy segédanyag által kiváltott allergiás reakciók.

Értesítse kezelőorvosát, amennyiben a felsorolt mellékhatások közül bármelyiket észleli, vagy egyéb mellékhatás lép fel.

5. TÁROLÁS

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A Canesten Plus bifonazol spray csak az 1. pontban felsorolt kórokozók által kiváltott tünetek kezelésére alkalmas. Ezért javasolt, hogy a kezelés megkezdése előtt tájékoztassa gyógyszerészét panaszairól. Ő segít majd kiválasztani az Ön számára legmegfelelőbb gyógyszert.