

BETEGTÁJÉKOZTATÓ

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi vény/rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Strepsils Lemon Sugar Free szopogató tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Strepsils Lemon Sugar Free szopogató tabletta szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Strepsils Lemon Sugar Free szopogató tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

STREPSILS LEMON SUGAR FREE szopogató tabletta

Hatóanyag: 0,60 mg amilmetakrezol, ill. 1,20 mg 2,4-diklór-benzil-alkohol tablettánként. Segédanyagok: kinolinsárga (E104), szacharin-nátrium, citrom aroma, borkósav, maltit szirup, izomalt.

Küllem: Szopogató tabletta: kerek, lapos, sárga, jellegzetes citrom ízű, mindkét oldalán Strepsils logóval ellátott szopogató tabletták.

Csomagolás: 24 db szopogató tabletta színtelen, átlátszó PVC/PVDC//Al buborékfóliában és dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, Egyesült Királyság

Gyártó:

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

Nottingham Site, Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Egyesült Királyság

1. Milyen típusú gyógyszer a Strepsils Lemon Sugar Free szopogató tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Szopogatásra szánt és citromízesítésű torokfertőtlenítő gyógyszerkészítmény.

Hatékonyan alkalmazható a torok-, garat-, mandulagyulladás, fogínygyulladás, szájnyálkahártya-gyulladás kezelésére, valamint a szájüregben végzett műtétek (mandula, fog, stb.) után a kellemetlen szájszag mérséklésére, ill. a másodlagos fertőzések megakadályozására.

Gyorsan enyhíti a helyi tüneteket, a kínzó torokfájást.

Amilmetakrezol és diklorobenzil-alkohol tartalma fertőtlenítő hatású.

A tabletta cukrot nem tartalmaz, ezért cukorbeteg is használhatja.

2. Tudnivalók a Strepsils Lemon Sugar Free szopogató tabletta szedése előtt

Ne alkalmazza a szopogató tablettát:

A készítmény bármely összetevőjével szembeni ismert túlérzékenység esetén nem szabad használni.

A készítmény alkalmazása 3 éves életkor alatt a félrenyelés fokozott veszélye miatt nem javasolt.

A megadott dózist nem szabad túllépni.

Fontos információk a kezelés megkezdése előtt:

Ha a gyógyszer alkalmazásakor néhány napon, maximálisan 1 héten belül a tünetek nem enyhülnek, vagy láz, fejfájás, émelygés, hányás is jelentkezik, egyéb kezelésre van szükség és orvoshoz kell fordulni.

Terhesség, szoptatás:

Amennyiben Ön terhes vagy szoptat, tájékoztassa orvosát és kérje ki tanácsát a gyógyszer szedése előtt.

Egyéb gyógyszerek alkalmazása:

Klinikailag jelentős gyógyszerköölcsönhatás nem ismert.

Jelenleg, illetve közelmúltban szedett receptköteles vagy recept nélkül kiváltható gyógyszereiről tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét.

Forduljon orvosához, ha a fenti pontok valamelyike érinti Önt, vagy bármikor a múltban érintette Önt.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre

Nem észleltek ilyen hatást.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A STREPSILS LEMON SUGAR FREE SZOPOGATÓ TABLETTÁT?

Amennyiben a kezelőorvos másképp nem rendeli, szokásos adagja:

Felnőttek:

Naponta 5 alkalommal 2-3 órás időközönként 1-1 tablettát lassan elszopogatni, közvetlenül étkezések után. A táplálkozást, ivást és fogmosást ezután 1-2 órán át kerülni kell.

Gyermekek:

3 éves kor alatti gyermekeknek alkalmazása nem ajánlott.

3-5 éves korú gyermekeknek naponta 3 tablettát.

5 éves kor feletti gyermekeknek naponta 3-4 tablettát.

Idős kor

Idős korban nem szükséges a javasolt adagot csökkenteni.

A gyulladás tünetei általában néhány (4-6) napon belül megszűnnek.

Ha az előírnál több szopogató tablettát vett be:

A Strepsils Lemon Sugar Free szopogató tablettát természetes és kizsírálása miatt véletlen vagy szándékos túladagolás nagyon valószínű.

Esetleges túladagolása a gyomor-bél rendszer diszkomfort érzését okozhatja.

Ha elfelejtette bevenni adagját:

Ha az előírnál több Strepsils Lemon Sugar Free szopogató tablettát vett be, azonnal forduljon orvosához.

Ha adagját elfelejtette bevenni, a következő alkalommal ne vegyen be dupla adagot, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének teszi ki magát.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek a Strepsils Lemon Sugar Free szopogató tablettának is lehetnek mellékhatásai.

A gyógyszer használata során igen ritkán bőrpír, szájnyálkahártya irritáció, a kezelés első napján a nyelv szúró, égő érzése, gyomorégés előfordulhat.

Minden gyógyszerrel szemben kialakulhat túlérzékenységi reakció. Ezért felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben szokatlan tüneteket (pl. duzzadás, bőrkíütés, hirtelen vérnyomásesés stb.) észlel, a gyógyszer szedését abba kell hagyni, és feltétlenül forduljon kezelőorvosához.

5. TÁROLÁS

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

OGYI-T-9995/01 (24 db)

Betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2009. április 4.