

## **ASA 75-EP filmtabletta**

## **ASA 100-EP filmtabletta**

**Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.**

- Ez a gyógyszer orvosi vény/rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3-4 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

### **A betegtájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer az ASA 75-EP és az ASA 100-EP filmtabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az ASA 75-EP és ASA 100-EP filmtabletta szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni az ASA 75-EP és ASA 100-EP filmtablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

*Hatóanyag:* 75 mg, illetve 100 mg acetilszalicilsav filmtablettánként.  
*Segédanyagok:* vízmentes kolloid szilícium-dioxid, mikrokristályos cellulóz, burgonyakeményítő, laktóz-monohidrát  
*Bevonat:* glicerín-triacetát, talkum, metakrilsav-etil-akrilát-kopolimer (1:1), 30 %-os diszperzió  
*Küllem:* Filmtabletta: fehér, kerek, csillogó-, sima-, és mindkét oldalán domború felületű gyomornedv-ellenálló filmtabletta.  
*Csomagolás:* 30 db, 50 db és 100 db gyomornedv-ellenálló filmtabletta átlátszó, szintelen PVC//Al buborékfóliában és dobozban.

**Gyártó és a forgalombahozatali engedély jogosultja:**

ExtractumPharma zrt.

1044 Budapest, Megyeri út 64.

### **1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER AZ ASA 75-EP és AZ ASA 100-EP FILMTABLETTA ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?**

Szívinfarktus utáni visszaesés megelőzésére, trombózisos érrendszeri műtét után, átmeneti agyi vérellátási zavar esetén az agyi infarktus megelőzésére (ischemiás probléma) alkalmazható gyógyszer. Vérrögképződést gátló (anti-trombotikus) hatása a vérlemezkék (trombociták) tromboxán A<sub>2</sub> szintézisének gátlásán alapul.

### **2. TUDNIVALÓK AZ ASA 75-EP és ASA 100-EP FILMTABLETTA SZEDÉSE ELŐTT**

**Nem alkalmazható a készítmény, ha Ön:**

- Acetilszalicilsavval, szaliciláttal vagy hasonló anyagokkal szemben túlérzékeny,
- Gyomor és bélfekély esetén,
- Vérzékenység esetén,
- Veseelégtelenség esetén.

**Fontos információk a kezelés megkezdése előtt**

Előre kitűzött idejű sebészeti beavatkozáskor figyelembe kell venni a készítmény esetleges antitrombotikus hatását.

Tartós alkalmazása vesebántalmakhoz vezet, ezért a vesefunkciót rendszeresen ellenőrizni kell.

**A készítmény fokozott elővigyázatossággal alkalmazható:**

Különleges óvatosságra van szükség, ha a beteg túlérzékeny bizonyos nem-szteroid gyulladáscsökkentő készítményekre, valamint gyomor- és bélrendszeri fertőzés, máj- és veseelégtelenség, krónikus gyomor vagy nyombél panasz, vérszegénység, asztmás légzés esetén.

Az acetilszalicilsav lázas, beteg gyermekeknek és serdülőknek csak egyéb terápiás lehetőség hiányában adható. Ha ezekben a megbetegedésekben hosszantartó hányás lép fel, ez potenciálisan életveszélyes betegség, a Reye-szindróma jele is lehet, ami feltétlenül azonnali orvosi ellátást igényel.

#### **A készítmény együttes alkalmazása étellel/italal**

Az acetilszalicilsav-kezelés ideje alatt alkoholt fogyasztani nem szabad.

#### **Egyéb gyógyszerek alkalmazása (gyógyszerkölcsonhatás)**

Az ASA 75-EP és ASA 100-EP filmtabletták más gyógyszerkészítményekkel történő együttes alkalmazása befolyásolhatja azok hatását. Ezért feltétlenül tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható gyógyszereket is.

#### **Terhesség**

A terhesség utolsó három hónapjában nem alkalmazható, a terhesség első hat hónapjában indokolt esetben, az előny/kockázat gondos mérlegelése után szedhető.

#### **Szoptatás**

Szoptatási időszakban a készítményt csak igen indokolt esetben szabad alkalmazni.

#### **A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek üzemeltetéséhez szükséges képességekre**

Nem befolyásolja hátrányosan az ezekhez szükséges képességeket.

### **3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI AZ ASA 75-EP és ASA 100-EP FILMTABLETTÁT?**

Egyszeri napi adag 75 mg -100 mg.

A gyors hatás érdekében 150 mg -300 mg kezdő adag ajánlott.

A filmtablettát egészben kell folyadékkal bevenni.

Hosszútávú kezelésre alkalmazzák, ezért szükséges a vesefunkció rendszeres ellenőrzése.

### **4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK**

Mint minden gyógyszernek, az ASA 75-EP és ASA 100-EP filmtablettának is lehetnek mellékhatásai.

Előfordulnak gyomor és bélpanaszok, esetleg émelygés, hányás, hasmenés. A magas adag hosszabb ideig tartó alkalmazása esetén fülszengést, emésztőrendszeri fekélyeket okozhat, esetleg súlyos vérzéssel párosulva. A készítmény továbbá máj- és vesebántalmakat okozhat. Meghosszabbodik a véralvadási idő, rejtett emésztőrendszeri vérzést idézhet elő, amelyek vashiányhoz vezethetnek. Ha az itt felsorolt nemkívánatos hatásokon kívül egyéb szokatlan tüneteket észlel, értesítse háziorvosát vagy gyógyszerészét.

### **5. TÁROLÁS**

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

OGYI-T-10102/01-03 (ASA 75-EP filmtabletta) 30 db/50 db/100 db  
OGYI-T-10027/01-03 (ASA 100-EP filmtabletta) 30 db/50 db/100 db

A beteg tájékoztató OGYI eng. száma: 4398/41/06