

Béres Trinell Pro® filmdoboz



Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót!

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körülmények közötti alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet!

További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez!

Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak!

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható, és hogyan fejti ki hatását a Béres Trinell Pro® filmdoboz?
2. Tudnivalók a Béres Trinell Pro® filmdoboz szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Béres Trinell Pro® filmdobozt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Milyen hatóanyagokat és segédanyagokat tartalmaz a készítmény?

Hatóanyagok:

500 mg paracetamol, 300 mg propifenazon, 75 mg koffein filmdobozként.

Segédanyagok:

Mag: vízmentes koloid szilícium-dioxid, talkum, magnézium-sztearát, A típusú karboximetil-keményítónátrium, kalcium-hidrogén-foszfát-anhidrát, mikrokristályos cellulóz, povidon.

Bevonat: hipromellóz, mikrokristályos cellulóz, makrogol-sztearát, titán-dioxid (E 171).

Csomagolás:

4db, 10db és 20db filmdoboz átlátszó PVC / Alu buborékfóliában és dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Béres Házipatika Kft.

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

Gyártó:

Béres Gyógyszergyár Zrt.

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejti ki hatását a Béres Trinell Pro® filmdoboz?

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása?

A készítmény szedése javasolt enyhe-középsúlyos fájdalom, pl. menstruációs fájdalom, fejfájás, migrén, fogfájás, reumás fájdalom, műtéteket követő fájdalom enyhítésére, illetve meghűlés okozta fájdalom és láz csillapítására.

2. Tudnivalók a Béres Trinell Pro® filmdoboz szedése előtt

Mikor nem szabad a készítményt szedni?

Fenilbutazon, acetilszalicilsavat, pirazolont, vagy hasonló vegyületeket (fenazon, propifenazon, aminofenazon, metamilol) tartalmazó gyógyszerekkel, ill. a készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén. Örökletes glukóz-6-foszfát dehidrogenáz enzimhiányban, súlyos máj- és/vagy vesebetegség, porfirin anyagcserezavar (porfíria) és túlzott vagy krónikus alkoholfogyasztás esetén, valamint 12 éves kor alatt.

Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt

Ne szedje a gyógyszert az adagolásban megadottnál nagyobb adagban, valamint orvosi utasítás nélkül egy hétnél hosszabb ideig. Ha három napnál tovább láza vagy fájdalma van, forduljon orvoshoz. Ha asztmás, fájdalomcsillapítóra vagy reumaelleni szerre túlérzékeny, ha más betegségben vagy allergiában szenved, véralvadásgátlót szed, a Béres Trinell Pro® filmtabletta szedése előtt kérje ki orvosa véleményét! A gyógyszer szedése alatt alkohol fogyasztása kerülendő.

Szedhetik-e gyermekek is a készítményt?

A filmtablettát gyermekek (12 éves kor alatt) nem szedhetik.

Alkalmazható-e a készítmény más gyógyszerekkel?

Az együtt szedett készítmények egymás hatását befolyásolhatják. Altatószer, a gyomor ürülését befolyásoló készítmény, kloramfenikol, metoklopramid, allergia elleni készítmény, véralvadásgátló, fogamzásgátló szer egyidejű szedése előtt forduljon kezelőorvosához.

Mit kell megfontolni terhesség és szoptatás ideje alatt?

Kérdéseivel bármely gyógyszer szedése előtt forduljon orvosához, vagy gyógyszerészéhez. Terhes anyák a készítményt ne szedjék a terhesség első 3 hónapjában, ill. utolsó hat hetében. Egyéb időszakban a gyógyszer szedése előtt konzultáljon kezelőorvosával! A készítmény szedése a szoptatás időszakában ellenjavallt.

3. Hogyan kell alkalmazni a Béres Trinell Pro® filmtablettát?

Mi az ajánlott adag?

Felnőtteknek, a fájdalom erősségétől függően, egyszeri adagja 1 filmtabletta. Szükség esetén az egyszeri adag 24 órán belül háromszor ismételhető. A napi maximális adag 4 filmtabletta.

Hogyan és mikor kell a készítményt bevenni?

Fájdalom esetén a készítményt egészben, bőséges folyadékkal (pl. víz, tea, gyümölcsle stb.) kell bevenni.

Mennyi ideig szedhető a készítmény?

Ha panaszai a napi ajánlott maximális dózis esetén is tartósan fennállnak (3 napon túl), forduljon kezelőorvosához!

Mire kell még ügyelnie a készítmény szedése során?

Ha a tablettát folyadék nélkül szájában tartja, ill. így nyeli le, az megszínezheti a nyelvet és a szájnyálkahártyát, mely jelenség ártalmatlan és nem befolyásolja a gyógyszer hatékonyságát.

4. Lehetséges mellékhatások

Az alábbi mellékhatások bármelyikének észlelésekor a gyógyszer szedését abba kell hagyni, és orvoshoz kell fordulni! A készítmény szedése mellett ritkán allergiás jelenségek (csalánkiütés, bőrvizketés) felléphetnek. Nagyon ritkán, az arra érzékenyeknél légzési (nehézlégzés, asztma) és keringési rendszerrel kapcsolatos problémák jelentkezhetnek.

Túladagolás:

Nagy adag tartós alkalmazása súlyos, visszafordíthatatlan májkárosodást, vesefunkció romlást okozhat. A paracetamol túladagolás tünetei: hányinger, hányás, étvágytalanság, rossz közérzet, hasi fájdalom. A túladagolás halálhoz vezető májkómát okozhat.

A koffein túladagolás tünetei: izgatottság, remegés, fülzúgás, szívritmus zavarok.

Túladagolás esetén azonnal orvosi segítséget kell kérnie!

5. Tárolás

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

OGYI-T-9400/01-03

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma:
2008. november 6.

HTPr 5/09