

Betegtájékoztató

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Lioton® 100 000

gél

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Lioton 100 000 gél és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Lioton 100 000 gél alkalmazása előtt.
3. Hogyan kell alkalmazni a Lioton 100 000 gél?
4. Lehetséges mellékhatások.
5. A készítmény tárolása.

Mit tartalmaz a készítmény?

Hatóanyag:

0,833 g (100 000 NE) heparin-nátrium 100 g gélben.

Egyéb összetevők:

Propil-parahidroxibenzoát, narancsvirágolaj, levendulaolaj, metil-parahidroxibenzoát, trolamin, karbomer 940, etanol, tisztított víz.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Firenze, Olaszország

Forgalmazza:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg
125, 12489 Berlin, Németország

Gyártó:

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services
S.r.l., Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, Olaszország

Csomagolás:

20 g, 50 g vagy 100 g gél csavaros, műanyag kupakkal lezárt tubusba töltve.
1 tubus dobozban.

1. Milyen típusú gyógyszer a Lioton 100 000 gél és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Lioton 100 000 gél egy heparin tartalmú gél készítmény külsőleges használatra. Alkalmazása olyan kóros, gyulladásos vagy sérülésszerű eredetű bőrelváltozásokban javallt önmagában vagy egyéb kezeléssel kiegészítve, amelyekben a helyi kezelés duzzadást (exsudációt, ödémát) csökkentő, vérárvadást, illetve gyulladást gátló hatásától pozitív eredmény várható.

A Lioton 100 000 gél használata elsősorban a vénák belgyógyászati, érsebészeti, balesetsebészeti és ortopédiai jellegű gyulladásos megbetegedései esetén javasolt.

Milyen esetekben alkalmazható a Lioton 100 000 gél?

A felszíni vénák megbetegedésének kezelésére, így visszértágulat és szövődményei, felületi vénás trombózis, a vénák körüli szövetek vagy a vénafal gyulladása, lábszárfekély, műtét utáni visszérgyulladás esetén, valamint vena saphena műtét (saphenectomy, a véna műtéti eltávolítása) után alkalmazható.

Használata javasolt sérülések, zúzódások, véraláfutások, helyi duzzanatok és gyulladások, illetve az izmok és inak, valamint az ízületek sérülései és húzódásai esetén is.

2. Tudnivalók a Lioton 100 000 gél alkalmazása előtt

A Lioton 100 000 gél nem alkalmazható:

- Heparinnal vagy a készítmény bármely egyéb összetevőjével – paraben allergia – szembeni túlérzékenység esetén.
- Nyílt bőr- vagy nyálkahártya sérülés, vérzés esetén.
- Gennyes folyamatokban a fertőzés helyén.

Milyen esetekben kell fokozott elővigyázatossággal eljárni?

Bevérzések előfordulása esetén azonnal a kezelőorvoshoz kell fordulnia.

A Lioton 100 000 gél segédanyagként metil- és propil-parahidroxibenzoátot tartalmaz, ezért nem szabad paraben allergiák esetén használni.

Alkalmazható-e a készítmény terhesség vagy szoptatás esetén?

Kérdéseivel bármely gyógyszer szedése előtt forduljon orvosához, vagy gyógyszerészéhez.

Terhesség és szoptatás alatt csak az előny/kockázat gondos mérlegelése után alkalmazható. Ennek eldöntésében kérjen kezelőorvosától tanácsot.

Ismeretes, hogy a hatóanyag nem jut át a placentán, illetve nem választódik ki az anyatejben, azonban alkalmazásával kapcsolatban specifikus adatok nem állnak rendelkezésre.

Mire kell figyelni más gyógyszerekkel való együttes alkalmazás esetén?

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

A heparin alkalmazása tovább növelheti a protrombin időt a szájon át szedett véralvadástgátló készítményekkel (úgynevezett antikoagulánsokkal) kezelt betegek esetében.

3. Hogyan kell alkalmazni a Lioton 100 000 gél?

Az érintett bőrfelületen naponta 1-3 alkalommal 3-10 cm-nyi gél gyengéden masszírozzunk be. Elegendő tapasztalat híján alkalmazása gyermekek számára nem javasolt.

4. Lehetséges mellékhatások

A heparinnal szembeni allergiás reakciók a bőrön történő alkalmazás esetén nagyon ritkák. Túlérzékenységi reakciók, pl. bőrpír és viszketés elvétve előfordulhatnak, de a készítmény alkalmazásának abbahagyását követően általában gyorsan elmúlnak.

5. A készítmény tárolása

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Lioton 100 000 gél 50 g OGYI-T-7245/01

Lioton 100 000 gél 100 g OGYI-T-7245/02

Lioton 100 000 gél 20 g OGYI-T-7245/03

A beteg tájékoztató engedélyezésének dátuma: 2008.11.21