

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.

Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei egy héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

Mik a készítmény összetevői?

Hatóanyag: 10 mg cetirizinium chloratum – filmtablettaként.

Egyéb összetevők: laktóz-monohidrát, mikrokristályos cellulóz, kolloid vízmentes szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, Opadry Y-1-7000 (titán dioxid, hipromellóz, macrogol 400).

Mi a Cetirizin-ratiopharm filmtabletta és mire szolgál?

Allergia ellenes készítmény

Bizonyos allergiás megbetegedések tüneteinek a kezelése szolgáló gyógyszer:

- az idült csalánkiütést (urticaria) kísérő panaszok: mint viszketés, duzzanatképződés, bőrpír kezelésére,
- a szénanáthát (szezonális allergiás rhinitis) és egész éven át tartó allergiás náthát (perenniális allergiás rhinitis) kísérő panaszok, pl. tüsszögés, orrfolyás, orrvizketés, orrdugulás kezelésére.

Mikor nem alkalmazható a készítmény?

- súlyos vesebetegségben,
- a hatóanyag vagy bármely más alkotórész iránti túlérzékenység esetén,
- terhesség ideje alatt,
- szoptatás ideje alatt,
- 2 éves kor alatti gyermekeknek.

Milyen betegségekről kell a kezelőorvost tájékoztatni a gyógyszer szedésének elkezdése előtt?

Vese- és/vagy májbetegségben szenvedő betegek tájékoztassák kezelőorvosukat betegségükről a gyógyszer szedésének elkezdése előtt.

Hogyan kell a tablettát alkalmazni?

A betegájékoztató előírása vagy orvosi utasítás szerint, az orvos által rendelt mennyiségben és az orvos által előírt ideig alkalmazható!

Ha nem biztos az adagolásban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét! Ha az orvos másképp nem rendeli, szokásos adagja:

Felnőtteknek és 12 éves kor feletti gyermekeknek:

A szokásos adag naponta 1-szer 1 filmtabletta, lehetőleg este.

2-12 éves kor közötti gyermekeknek:

- 30 kg alatti testsúly esetén:
A szokásos adag naponta 1-szer 1/2 filmtabletta, lehetőleg este.
- 30 kg feletti testsúly esetén:
A szokásos adag naponta 1-szer 1 filmtabletta, lehetőleg este, vagy naponta 2-szer 1/2 filmtabletta (reggel és este).

Vese- és/vagy májbetegeknek általában a szokásos adag felét kell bevenni.

Hogyan és mikor kell bevenni a gyógyszert?

A filmtablettát szétrágás nélkül, folyadékkal, lehetőleg este kell bevenni. A készítmény az étkezésektől függetlenül bevehető.

Mire kell figyelni, ha kevés gyógyszert vett be, vagy egy adagot elfelejtett bevenni?

Folytassa a gyógyszer szedését az adagolási útmutatásban leírtak szerint.

Ne vegyen be kétszeres mennyiségű gyógyszert!

Mire kell ügyelnie a terhesség és a szoptatás alatt?

A gyógyszert nem szabad terhesség és szoptatás alatt alkalmazni. A hatóanyag átjut az anyatejbe.

Mit kell figyelni, ha Ön idős beteg?

Idős betegek különösen érzékenyek lehetnek a szokásos adagolás mellett esetleg jelentkező mellékhatásokra (pl. vizeelési nehézségek-különösen férfiak esetében, szájszárazság, zavartság, szédülés, álomosság, vérnyomásesés, esetleg túlzott izzagottság). Ezekről, valamint egyéb szokatlan tünetek jelentkezéséről a kezelőorvost értesíteni kell.

Mire kell ügyelnie a közúti közlekedés során, gépek kezelésekor vagy biztonságos támasz nélkül végzett munkavégzéskor?

Azoknak a betegeknek, akik autót vezetnek, gépeket kezelnek vagy biztonságos támasz nélkül dolgoznak fokozottan figyelni kell, hogy milyen a gyógyszerre adott egyéni reakciójuk. Ha a gyógyszer fejfájást, szédülést, álomosságot okoz, és így a koncentráció képességet csökkenti, kérje a kezelőorvos utasítását, arra vonatkozóan, hogy vezethet-e autót és végezhet-e baleseti veszéllyel járó munkát.

Milyen mellékhatások léphetnek fel a készítmény alkalmazásakor?

Ritka esetekben enyhe és átmeneti mellékhatások, pl. fejfájás, szédülés, álomosság, nyugtalanság, fáradtság, szájszárazság és gyomor-bél panaszok fordulhatnak elő.

Egyes betegek esetében túlérzékenységi reakciókat és májműködési zavarokat figyeltek meg.

Ha Ön mellékhatásokat észlel, olyat is esetleg, amelyek nem szerepelnek a leírásban, közölje azokat orvosával.

Milyen gyógyszerek befolyásolják a Cetirizin-ratiopharm filmtabletta hatását?

Jelenleg más gyógyszerekkel való kölcsönhatás nem ismeretes.

Milyen élvezeti szereket, ételeket és italokat kell kerülnie?

A gyógyszer szedése esetén alkoholt fogyasztani TILOS.

Mi a teendő a gyógyszer túladagolása során (szándékos vagy véletlen túladagolás)?

Túladagolás során a felsorolt mellékhatások felerősödve jelentkezhetnek.

A készítmény túladagolásának gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

Mi a teendő ha az orvos bőrteszt-vizsgálatot rendel el?

Bőrteszt-vizsgálatok elvégzése előtt legalább 3 nappal abba kell hagyni a gyógyszer szedését.

Meddig lehet a készítményt felhasználni?

A gyógyszer lejárati ideje a csomagoláson olvasható. A gyógyszert a lejárati időn túl nem szabad felhasználni! A készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Hogyan kell tárolni a gyógyszert?

Szobahőmérsékleten (30 °C alatt) kell a gyógyszert tárolni.

Csomagolás: a készítmény 20, 30, 50 vagy 100 filmtablettát tartalmaz dobozonként.

Gyártó: Merckle GmbH., Németország

Forgalombahozatali engedély jogosultja: ratiopharm Hungaria Kft., Budapest

OGYI-T- 7905/01 (20 db)

OGYI-T-7905/04 (30 db)

OGYI-T- 7905/02 (50 db)

OGYI-T- 7905/03 (100 db)