

SEPTOFORT tablettá

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel kezelőorvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek vagy éppen rosszabbodnak.

Milyen betegségek esetén használható a készítmény?

Fogínygyulladás, szájüregi fertőzések: afta, gombás fertőzések; protézis okozta szájüregi gyulladás, elgyógyult, garatgyulladás és mandulagyulladás helyi kezelése. Mandulaműtét és foghúzás után a szájhygiéne fenntartása. Különböző fájdalmas felmaródásokkal járó szájnyálkahártya betegségek kiegészítő kezelése.

Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a készítmény?

Hatóanyag: 2 mg klórhexidin-glukonát tablettánként.

Segédanyagok: Zöld színezék - Euroblend Green 600938 - (Quinolin sárga E104 és Patent Blue E131), magnézium-sztearát, fodormenta aroma, aszpartám, kukoricakeményítő, szorbit.

Milyen esetekben nem használható a tablettá?

A készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.

Alkalmazható-e egyidőben más készítményekkel a tablettá?

A Septofort tablettá szopogatása és a fogmosás között legalább 30 perccel kell eltelnie, mivel egymás hatékonyságát befolyásolják.

Hogyan kell használni a készítményt?

Naponta 3 alkalommal, legalább 2 órási időközönként 1-1 tablettát az étkezések után lassan elszopogatni. Alkalmazás után az étkezést és az ivást 1-2 órán át kerülni kell.

A tablettát cukorbeteg is használhatja, mivel édesítőszerként szorbitot tartalmaz.

Milyen mellékhatások léphetnek fel a kezelés ideje alatt?

Igen ritkán bőrpír, allergiás reakció, szájnyálkahártya érzékenység, a fogak és a nyelv sárgásbarna elszíneződése, ami rendszeres, erőteljes fogmosással, ill. a gyógyszer elhagyásával megszüntethető. Átmeneti ízérzés zavar és a nyelv égő érzése kezdetben előfordulhat.

Szorbit iránt érzékeny egyéneknél hasmenést okozhat.

Mit kell tudni a kezelés megkezdése előtt?

Szorbit tartalma miatt gyümölcscukor túlérzékenységben, valamint fruktóz-1,6-difoszfát enzimhiányban alkalmazása kerülendő.

Aszpartám tartalma miatt fenilketonuriás betegek esetében nem alkalmazható.

Befolyásolja-e a készítmény a járművezetési és gépközelítési képességeket?

Ezeket a képességeket a készítmény nem befolyásolja.

Mi a teendő túladozás esetén?

Nagy mennyiségű hatóanyag lenyelésekor túladozás előfordulhat. Ilyenkor tejet, tojásfehérjét kell inni, és azonnal értesíteni kell a kezelőorvost, vagy fel kell keresni a legközelebbi kórház sürgősségi osztályát.

Hogyan kell tárolni a tablettát?

25 °C alatti hőmérsékleten, az eredeti csomagolásban, száraz, fénytől védett helyen tartandó.

A gyógyszer csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül használható fel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

A FORGALOMBAHOZATÁLI ENGEDÉLY JOGOSULTJA

WALMARK, a.s.

Oldřichovice 44

739 61 Trinec

Csehország

Gyártó:

WALMARK, a.s.

Oldřichovice 44

739 61 Trinec

Csehország

OGYI-T 3843/02 12 db

OGYI-T 3843/03 24 db

A betegájékoztató engedélyezésének dátuma: 2008. augusztus 25.