

Bilobil® Vital kemény kapszula

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Páfrányfenyő levél (Ginkgo bilobae folium) száraz kivonat

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei 30 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Bilobil Vital kemény kapszula és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Bilobil Vital kemény kapszula szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Bilobil Vital kemény kapszulát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Bilobil Vital kemény kapszulát tárolni?
6. További információk

1. Milyen típusú gyógyszer a Bilobil Vital kemény kapszula és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A Bilobil Vital kemény kapszula páfrányfenyő (Ginkgo biloba) levelének száraz, standardizált kivonata, amely javítja az agy oxigén- és glukozellátását. A kivonat hatóanyagai, a flavon-glikozidok, ginkgolidok és bilobalidok tágtíják a véreket, fokozzák a véráramlást, csökkentik a vérelemek aggregációját, továbbá az anyagcsere-szabályozó hatások által megóvják a sejteket és a szöveteket az oxigénhiány okozta károsodástól. A Ginkgo-levéli kivonat hatásos az agy vérellátásának zavarai esetén.

A Bilobil Vital kemény kapszula serkenti az agyi vérkeringést és az anyagcserét, ezáltal kedvezően hat a szellemi és testi teljesítőképességre.

A Bilobil Vital kemény kapszula gyógynövény-készítmény, amelynek alkalmazása az agy vérellátásának zavarai és az Alzheimer kór okozta szellemi hanyatlás enyhé és középsúlyos formáiban, elsősorban a feledékenység súlyosbodásának lassítására ajánlott.

2. Tudnivalók a Bilobil Vital kemény kapszula szedése előtt

Ne szedje a Bilobil Vital kemény kapszulát:

Ha allergiás (túlérzékeny) a készítmény hatóanyagára vagy egyéb összetevőjére.

A Bilobil Vital kemény kapszula fokozott elővigyázatossággal alkalmazható:

A Bilobil Vital kemény kapszula nem ajánlott gyermekeknek.

A Bilobil Vital kemény kapszula szedése előtt tisztázni kell a tünetei eredetét, ugyanis a tünetek mögött álló alapbetegség külön kezelést igényelhet.

Műti beavatkozás előtt tájékoztassa az orvost, hogy Bilobil Vital kemény kapszulát szed, mivel az előzőleg szedett Ginkgo bilobae levél készítmény fokozhatja a vérzés kialakulásának veszélyét.

Ne lépje túl a javasolt gyógyszeradagot!

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek

Tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vénák nélküli kapható készítményeket is.

Nem tanácsos Bilobil Vital kemény kapszulát bevenni, ha Önt véralvadást gátló gyógyszerekkel kezelik, vagy ha rendszeresen szed acetilszalicilsavat tartalmazó gyógyszert, mivel ezekről történő egyidejű alkalmazás esetén fokozódik a vérzés kockázata.

A Bilobil Vital kemény kapszula egyidejű bevétele bizonyos ételekkel vagy italokkal

A készítményt étkezéstől függetlenül lehet bevenni folyadékkal, kivéve az alkoholtartalmú italokat.

Terhesség és szoptatás

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészával.

Terhesség és szoptatás időszakában nem ajánlott a készítmény alkalmazása, mivel kevés vonatkozó adat áll rendelkezésre.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Az eddigi ismeretek szerint a Bilobil Vital kemény kapszula nem befolyásolja ezeket a képességeket

Fontos információk a Bilobil Vital kemény kapszula egyes összetevőiről

A Bilobil Vital kemény kapszula tejcukrot (laktózt) tartalmaz. Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezd szedni ezt a gyógyszert.

3. HOGYAN KELL SZEDNI A BILOBIL VITAL KEMÉNY KAPSZULÁT?

A készítmény szokásos adagja felnőtteknek naponta 2x1 kapszula, amelyet reggel és este kell bevenni, étkezéstől függetlenül. A kapszulát

folyadékkal kell lenyelni.

A javulás első jelei általában egy hónap után figyelhetők meg. A tartós hatás érdekében – különösen idősebb betegeknek – legalább 3 hónapon keresztül ajánlott a Bilobil Vital kemény kapszulát szedni. 3 hónap után a kezelőorvossal vagy gyógyszerésszel kell megbeszélni az alkalmazás folytatásának szükségességét.

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

Ha az előírtnál több Bilobil Vital kemény kapszulát vett be

Ha az előírtnál nagyobb adagot vett be a készítményből, forduljon orvosához vagy a gyógyszerészhez. Ginkgo-kivonat okozta mérgezésről mindeztől nem számoltak be.

Ha elfelejtette bevenni a Bilobil Vital kemény kapszulát

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására!

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Bilobil Vital kemény kapszula is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Nagyon ritkán (10000 betegből kevesebb mint egy esetben fordul elő) az alábbi mellékhatások fordulhatnak elő:

emésztőrendszeri zavarok, fejfájás, túlérzékenységi reakciók a bőrön: viszketés, bőrvörösség, duzzanat.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A BILOBIL VITAL KEMÉNY KAPSZULÁT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on, az eredeti csomagolásban tárolandó.

A dobozon feltüntetett lejárati idő után ne szedje a Bilobil Vital kemény kapszulát. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy sürgéstelelné vált gyógyszereit miként semmisítse meg.

Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a készítmény

Hatóanyag:

120 mg páfrányfenyő levél száraz kivonat (40-50:1)

kivonószér: aceton 60%V/V

24-29% ginkgo flavon glikozid

6-9 % terpenlakton (ginkgolidok, bilobalid) tartalommal

Egyéb összetevők:

Kapszulátöltet: laktóz-monohidrát (198 mg), kukoricakeményítő, talkum, vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát.

A száraz kivonat előállításához alkalmazott segédanyag: porlasztva szárított glükóz szirup (legfeljebb 10%).

Kapszulahéj: fekete vas-oxid (E172), vörös vas-oxid (E172), sárga vas-oxid (E172), titán-dioxid (E171), zselatin.

Milyen a Bilobil Vital kemény kapszula külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Leírás: „0”-ás méretű, barna, nem átlátszó kemény kapszulába töltött 450 mg tömegű sárgásbarna vagy barna por sötétebb részecskéekkel, esetleg összetapadt rögökkel.

20 db (2x10) kapszula színtelen, átlátszó PVC/PVDC//Al buborékfóliában és dobozban.

60 db (6x10) kapszula színtelen, átlátszó PVC/PVDC//Al buborékfóliában és dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Teva Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt.,

1074 Budapest

Rákóczi út 70-72.

Magyarország



A gyártó:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6,

8501 Novo mesto

Szlovénia



OGYI-T-20749/01

(20 db)

OGYI-T-20749/02

(60 db)

A betegájékoztató engedélyezésének dátuma: 2009. szeptember 11.