

Cholagol oldat

10 ml

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- *Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.*
- *További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.*
- *Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.*

Milyen hatóanyagokat és milyen segédanyagokat tartalmaz a Cholagol oldat?

Hatóanyagok 1 ml oldatban:

Frangulaemodin	0,9 mg
Kurkuma	2,25 mg
Magnézium-szalicilát	18 mg
Eukaliptusz olaj	192,6 mg
Borsmenta olaj	360 mg

Segédanyagok: Levomentol, 96%-os etanol, finomított olívaolaj.

A készítmény 1ml-e 30 cseppnek felel meg.

Milyen betegségben alkalmazható és hogyan hat a Cholagol oldat?

A készítmény hatóanyagai főleg növényi eredetűek. Elsősorban az epe termelődését és kiválasztódását serkentik. Ezen kívül a Cholagol oldat enyhíti az epeutak simaizmainak görcsét, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő és emésztést elősegítő hatása (enyhe hashajtó, szélhajtó hatása) van.

A készítmény kiegészítő kezelésként alkalmazható epekő, krónikus epehólyag-gyulladás esetén, epeúti műtétek utáni, valamint krónikus májbetegség esetén jelentkező emésztési zavarokban. A készítmény alkalmazhatóságát beszélje meg kezelőorvosával.

A Cholagol oldat felnőttknél és serdülőknél 12 éves kor felett is alkalmazható.

Serdülőknél a készítmény csak orvosi utasításra alkalmazható.

Ha a betegség tünetei nem enyhülnek három napon belül, vagy az állapot romlik, illetve bármilyen mellékhatás vagy szokatlan reakció jelentkezik, a gyógyszer alkalmazásának folytatását beszélje meg kezelőorvosával.

Ha további információkra van szüksége, forduljon kezelőorvosához.

Mikor nem szabad a Cholagol oldatot alkalmazni?

A Cholagol oldat nem alkalmazható bármely összetevőjével szembeni ismert túlérzékenység esetén. Jelezze orvosának, ha korábban bármelyik gyógyszerrel kapcsolatban szokatlan tüneteket tapasztalt.

A Cholagol oldat nem alkalmazható a máj és epeutak heveny (akut) gyulladása esetén, súlyos veseelégtelenségben szenvedő betegeknek, 12 évnél fiatalabb gyermekeknek, terhesség és szoptatás idején.

Szedhető-e más gyógyszerekkel együtt a készítmény?

Beszélje meg kezelőorvosával a Cholagol oldat és más gyógyszer egyidejű alkalmazását. Vegye figyelembe, hogy a készítmény 9,9% alkoholt tartalmaz.

Mi a teendő terhesség és szoptatás ideje alatt?

Nem szedhet Cholagol oldatot ha terhes, vagy szoptat.

Vezethet-e gépjárművet a kezelés ideje alatt?

A Cholagol oldat nem befolyásolja sem a figyelmet, sem a koncentrációs képességeket.

Hogyan kell szedni a Cholagol oldatot?

Az adagolást a kezelőorvos határozza meg.

Általában az epeutak hosszú távú betegsége és az epehólyagon végzett műtétek után felnőtteknek és serdülőknek 12 éves kor felett a javasolt adagja 5-10 csepp naponta háromszor. A bevett adagok között legalább 5 órának kell eltelnie. Epehólyaggörcs esetén egyszeri adagban 20 csepp alkalmazható.

A gyógyszert cukorra kell csepegtetni, és lehetőleg étkezés előtt fél órával kell bevenni. Gyomorégésre való hajlam esetén étkezés alatt, vagy azt követően is alkalmazható.

A gyógyszeres üvegből függőlegesen, fejjel lefelé kell csepegtetni.

Mi a teendő túladagoláskor?

Túladagolás esetén, vagy ha kisgyermek véletlenül lenyeli, és rossz közérzet, hasi fájdalom vagy görcs, hányás és hasmenés jelentkezik, keresse fel kezelőorvosát.

Milyen mellékhatások fordulhatnak elő a kezelés ideje alatt?

A gyógyszer rendszerint jól tolerálható. Kivételes esetben bőfőgés, rossz közérzet, gyomorégés fordulhat elő.

Hogyan kell tárolni a Cholagol oldatot?

Szobahőmérsékleten, legfeljebb 25 °C-on fénytől védve kell tárolni.

Figyelmeztetés:

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni. A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

Csomagolás:

Az üveg 10 ml oldatot tartalmaz.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Teva Magyarország Zrt., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Magyarország

OGYI-T-444/01

Betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2008. február 19.