



Talcid[®] rágótabletta

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Talcid rágótabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Talcid rágótabletta alkalmazása előtt.
3. Hogyan kell alkalmazni a Talcid rágótablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a készítmény?

Hatóanyag: 500 mg hidrotalcit (magnézium-alumínium-hidroxid-karbonát-tetrahidrát) tablettánként.

Segédanyagok: Banán aroma, szacharin-nátrium, borsmenta aroma, magnézium-sztearát, kukoricakeményítő, mannit.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Bayer Hungária Kft., Budapest

Gyártó:

Bayer Bitterfeld GmbH, Greppin, Németország

1. Milyen típusú gyógyszer a Talcid rágótabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A hidrotalcit nem-szisztémás savlekötő szer. Bizonyos típusú emésztési zavarok (gyomorégés, teltségérzés), akut és krónikus gyomorhurut, gyomorfekély, nyombélfekély esetén a gyomorsavtartalom csökkentésére alkalmazható.

2. Tudnivalók a Talcid rágótabletta alkalmazása előtt

Ne alkalmazza a készítményt:

A készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.
Súlyos veseelégtelenség esetén.

Figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések

A vesék kiválasztó működési zavara esetén a készítmény nagy adagban történő, ill. tartós alkalmazását kerülni kell.

Fokozott elővigyázatosság szükséges székrekedés; bélelzáródás és féregnyúlvány (vakbél)-gyulladás gyanúja esetén.

A gyógyszerert huzamosabb ideig csak orvosi utasításra szabad alkalmazni.

A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek:

Számos gyógyszer felszívódását módosíthatja, nem alkalmazható egyidejűleg tetraciklinekkel, ciprofloxacinnal, ofloxacinnal (antibiotikumok) továbbá nátrium fluoriddal, vaskészítményekkel, digoxinnal (szívre ható szer), kenodezoxikólsavval, ún. H₂ receptor blokkolókkal illetve véralvadásgátló gyógyszerekkel együtt, mert ezek felszívódását befolyásolja.

Általában minden más gyógyszert 1-2 órával hamarabb, vagy később kell bevenni felszívódásuk megváltozásának elkerülése érdekében.

Más gyógyszer - beleértve a vény nélkül kiadható készítményeket is - egyidejű alkalmazása esetén a kezelőorvost tájékoztatni kell.

Terhesség és szoptatás:

Terhesség és szoptatás időszakában beszélje meg kezelőorvosával a gyógyszer alkalmazását.

3. Hogyan kell alkalmazni a Talcid rágótablettát?

Szokásos adagja felnőtteknek:

Emésztési zavar és gyomorhurut esetén: 1-2 rágótabletta, naponta 3-4 alkalommal, főétkezések után 1- 2 órával, lefekvés előtt vagy a gyomorpanaszok jelentkezésekor.

Gyomor- és nyombélfekély esetén: 2 tabletta naponta 3-4 alkalommal.

A tablettákat el kell rágni.

4. Lehetséges mellékhatások

Nagyobb adagok alkalmazása esetén pépes széklet és gyakoribb székelés fordulhat elő. Az ajánlott adag alkalmazása esetén ezek a tünetek ritkán jelentkeznek.

Nagyobb adagok (napi 4-5 g, azaz napi 8-10 tabletta) bevétele esetén hányás, hasmenés jelentkezhet.

Haladéktalanul értesítse kezelőorvosát, amennyiben a felsorolt tünetek előfordulnak, vagy egyéb tünetet észlel.

5. Tárolás

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A csomagoláson feltüntetett lejárati időn túl nem szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T-4075/01

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 24319/55/03

Bayer