



Venter[®] tableta

Venter[®] granulátum

Betegtájékoztató

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi vény/rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 4 héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejt ki hatását a Venter tableta, ill. granulátum?
2. Tudnivalók a Venter tableta, ill. granulátum szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Venter tablettát, ill. granulátumot?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás
6. További információk

Mi a Venter tableta/granulátum?

Hatóanyag: 1000 mg sucralfatum tablettánként, illetve granulátumonként.

Segédanyagok:

Tableta: vízmentes kolloid szilícium-dioxid, magnézium-sztearát, talkum, kukoricakeményítő.

Granulátum: povidon, kukoricakeményítő, laktóz-monohidrát (760 mg).

Csomagolás:

50 db tableta

50 db tasak

A forgalombahozatali engedély jogosultja:

KRKA, d.d., Novo mesto, Szlovénia

1. MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ ÉS HOGYAN FEJTI KI HATÁSÁT A VENTER TABLETTA, ILL. GRANULÁTUM?

Milyen betegségek kezelésére szolgál a Venter?

Gyomor- vagy nyombélfekély kezelésére, illetve nyombélfekély kiújulásának megelőzésére alkalmazható.

Védi a gyomornyálkahártyát a gyomorsav, az emésztőenzimek és az epesavak hatásától. Ezenkívül vesebetegségben a vér kórosan magas foszfátszintjének csökkentésére is rendelheti az orvos.

2. TUDNIVALÓK A VENTER TABLETTA, ILL. GRANULÁTUM SZEDÉSE ELŐTT

Mikor nem szabad szedni a gyógyszert?

- A készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység,
- Súlyos vesebetegségben,
- Művese kezelés esetén.

Terhességről, szoptatásról, valamint vesemegbetegedéséről a kezelőorvost tájékoztatni kell.

Egyéb gyógyszer szedése esetén a kezelőorvos véleményét ki kell kérni.

Szedhető-e egyéb gyógyszer a kezelés alatt?

Abban az esetben, ha Ön savlekötő készítményt is szed, legalább fél órával az antacid bevétele előtt vagy az után kell bevennie a sucralfate-ot. A készítmény befolyásolja a tetracyclinek, a cimetidine, a ranitidine, egyes antibiotikumok, a digoxin, a szabályozott kioldású theophylline, a dicumarin, a ketoconazole, az L-thyroxin, a quinidine, valamint a phenytoin hatékonyságát. Ezért a Venter és egyéb gyógyszerek bevétele között legalább 2 órának kell eltelnie.

Az orvos által előírt ideig szedje a gyógyszert.

Mi a teendő ha elfelejtette bevenni a gyógyszert?

Ha elfelejtett bevenni egy tablettát, mielőbb pótolja a mulasztást, kivéve, ha már közeledik a következő adag bevitelének ideje. A továbbiakban az eredetileg előírt adagolási rend szerint szedje a gyógyszert.

Ha másik orvoshoz fordul vagy kórházba utalják, tájékoztassa az Önnel foglalkozó egészségügyi szakembereket az Ön által szedett gyógyszerekről. A sucralfate ugyanis csökkentheti bizonyos gyógyszerek felszívódását. Ezenkívül, ha Ön vesebeteg, a sucralfate kezelés ideje alatt rendszeresen ellenőrizni kell vére alumínium és foszfát szintjét.

Terhesség és szoptatás ideje alatt kizárólag egyedi orvosi elbírálás alapján szedhető a készítmény.

A készítmény a rendelkezésre álló adatok szerint nem befolyásolja a járművezetői- és gépkézeli képességeket.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A VENTER TABLETTÁT, ILL. GRANULÁTUMOT?

Hogyan kell szedni a Venter tablettát/granulátumot?

Amennyiben kezelőorvosa másképp nem rendeli szokásos adagja felnőtteknek: naponta 4-szer 1 tableta vagy tasak. A három főétkezés előtt 1/2 - 1 órával, valamint közvetlenül lefekvés előtt kell 1 tablettát, ill. 1 tasak granulátumot bevenni.

A tablettát egészben, kevés folyadékkal vagy fél pohár vízben feloldva kell bevenni.

A tasak tartalmát fél pohár vízben feloldva kell bevenni.

Mi a teendő túlادagolás esetén?

Ha nagy mennyiségű Ventert vesz be egyszerre tévedésből vagy egy gyermek nyelt le véletlenül a készítményből, haladéktalanul forduljon orvoshoz vagy a legközelebbi kórház sürgősségi osztályához.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Milyen mellékhatások léphetnek fel a kezelés ideje alatt?

Leggyakoribb mellékhatása a székrekedés; ritkábban más tápcsatornai rendellenességek (hasmenés, émelygés és szájszárazság), viszketés, hátfájás, álmatlanság vagy szédülés is jelentkezhetnek.

Veseelégtelenségben emelkedhet a szövetek alumínium-koncentrációja.

5. TÁROLÁS

Legfeljebb 25°C-on, nedvességtől védve tartandó.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Bármely további kérdése van a gyógyszer szedésével kapcsolatban, forduljon kezelőorvosához vagy a gyógyszerészhez.

A további részletes információ érdekében jelentkezzen az alábbi címen:

KRKA Képviselet

Budapest, Magyarország

Venter tablettá: OGYI-T-1798/01

Venter granulátum: OGYI-T-1799/01

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 11.138/55/2002