

Zinnat[®] 125 mg filmtabletta

Zinnat[®] 250 mg filmtabletta

Zinnat[®] 500 mg filmtabletta

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.
- E gyógyszert az orvos személyesen Önnek írta fel. A készítményt másoknak átadni nem szabad, mert számukra ártalmas lehet még abban az esetben is, ha tüneteik az Önéhez hasonlóak.



Mit tartalmaz az Ön gyógyszere?

Hatóanyag:

Zinnat 125 mg tablettá: 125 mg cefuroxim (150,36 mg cefuroxim-axetil formájában) filmtablettánként.

Zinnat 250 mg tablettá: 250 mg cefuroxim (300,72 mg cefuroxim-axetil formájában) filmtablettánként.

Zinnat 500 mg tablettá: 500 mg cefuroxim (601,44 mg cefuroxim-axetil formájában) filmtablettánként.

Segédanyagok: kolloid szilícium-dioxid, nátrium-lauril-szulfát, hidrogénezett növényi olaj, kroszkarmellóz-nátrium, mikrokristályos cellulóz.

Bevonat: propil-parahidroxibenzoát, metil-parahidroxibenzoát, propilénlglikol, „Opaspray white M-1-7120J”, hipromellóz.

Hogyan hat és mire szolgál a gyógyszer?

Egyes baktériumok okozta fertőzőes megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyszer.

Mielőtt szedni kezdené a gyógyszert

Feltétlenül tájékoztassa orvosát a kezelés megkezdése előtt, ha:

- allergiás cefuroximra, a készítmény bármely összetevőjére, továbbá penicillinekre vagy más antibiotikumokra,
- terhes,
- szoptat.

Fontos, hogy tájékoztassa kezelőorvosát, milyen más gyógyszereket szed, beleértve a vény nélkül vásárolt készítményeket is. Beszélje meg orvosával vagy gyógyszerészével, ha fogamzásgátló tablettát szed. Mint egyes más antibiotikumok esetében, szükséges lehet kiegészítő fogamzásgátló módszer alkalmazására is.

Hogyan kell szedni a gyógyszert?

Kizárólag orvosi rendelre, az orvos által meghatározott adagban és ideig szedhető.

A tablettát étkezés után, szétrágás nélkül kell bevenni, előzetesen szétörni nem szabad.

A gyógyszert az orvos által előírt ideig kell szedni, akkor is, ha állapota hamarabb javul.

A kezelés idő előtti abbahagyása ugyanis a betegség rosszabbodásához vezethet.

Mi a teendő, ha az előírtnál nagyobb adagot vett be?

Ha véletlenül több gyógyszert vett be az előírtnál, nem valószínű, hogy ez bármilyen komoly panaszt okozna. Mindazonáltal, tájékoztassa erről kezelőorvosát vagy a gyógyszerészt!

Mi a teendő, ha elfelejtett bevenni egy adagot?

Ha egy adagot elfelejtett bevenni, ne aggódjon, és vegye be a következőt, amint eszébe jut.

Ezután folytassa a gyógyszer szedését a szokásos módon.

Mellékhatások

Ha a gyógyszer szedése alatt nehézlégzés, mellkasi szorító érzés, a szemhéj, az arc vagy az ajkak duzzanata, a bőrön piros foltok, kiütések jelentkeznek, a gyógyszer szedését abba kell hagyni és azonnal orvoshoz kell fordulni.

Előfordulhat a kezelés alatt hasmenés, hányinger, hányás, hasi fájdalom, fejfájás, szédülés.

Ilyenkor nem szükséges abbahagyni a gyógyszer szedését, de az orvost mielőbb tájékoztatni kell.

Bármilyen egyéb nemkívánatos tünet észlelésekor, vagy ha a betegség rosszabbodna, ill. a gyógyszer már elfogyott, de a beteg még nincs jól, minél hamarabb orvoshoz kell fordulni.

A gyógyszer tárolása

A Zinnat tabletták legfeljebb 30 °C-on tárolhatók.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó:

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

GlaxoSmithKline Kft.,
1124 Budapest, Csörsz u. 43.

Gyártó:

Glaxo Wellcome Operations,
Harmire Road, Barnard Castle,
Co. Durham, DL12 8DT,
Egyesült Királyság

OGYI-T-1399/01 (Zinnat 125 mg filmtabletta)

OGYI-T-1400/01 (Zinnat 250 mg filmtabletta)

OGYI-T-1401/01 (Zinnat 500 mg filmtabletta)

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2007. november 7.

GlaxoSmithKline

A Zinnat a GlaxoSmithKline vállalatcsoport bejegyzett védjegye.