

Bolus adstringens

tabletta

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a készítmény?

Összetétele:

Hatóanyagok:

150 mg csersavas fehérje

150 mg bázisos bizmut-gallát

300 mg nehéz kaolin

Segédanyagok: talkum, szacharóz, burgonyakeményítő, folyékony paraffin, magnézium-sztearát.

A tabletta külleme: zöldesszürke, kerek tabletta, egyik oldalán „BOLUS ADST.” jelzés található.

Kíszerelés: Barna üvegben 50 tabletta.

Gyártó és a forgalombahozatali engedély jogosultja:



EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

H-1106 BUDAPEST, Keresztúri út 30-38.

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható a készítmény?

Javallatok: A Bolus adstringens tabletta egy több összetevőből álló belfertőtlenítő készítmény, amelynek hatóanyagai megkötik a bélben jelenlévő mérgező anyagokat és védő bevonatot képeznek a belek falán. Fertőzőesés bélmegbetegedések, mérgezéses gyomor- és bélbántalmak kezelésére szolgál.

2. Tudnivalók a gyógyszer szedése előtt

Mikor nem szabad Bolus adstringens tablettát szednie?

Ha a készítmény bármely összetevőjével szemben túlérzékenységet (allergiát) tapasztalt.

A Bolus adstringens és az étkezés/folyadékfogyasztás:

A gyógyszer lassítja a bélműködést, így a kellő hatékonyság elérése céljából fontos a bő folyadékbevitel (1–2 liter limonádé vagy tea). A hasmenéssel járó sóvesztesség pótlására ajánlatos egy liter vízben vagy limonádében 1 teáskanál sót feloldani, és azt elfogyasztani, vagy sós süteményt enni.





Terhesség és szoptatás:

A Bolus adstringens terhességben és szoptatás ideje alatt történő alkalmazásáról nincs megfelelő tapasztalat, ezért fenti állapotokban feltétlenül kérjen tanácsot orvosától, mielőtt elkezdené szedni a készítményt.

A készítmény hatása a gépjárművezetésre és a baleseti veszéllyel járó munkavégzésre:

Nem várható, hogy a fenti képességeket befolyásolja.

Fontos információk a Bolus adstringens tablettá egyez összetevőiről:

A készítmény tablettaként 33 milligramm répacukrot (szacharózt) tartalmaz. Rendeltetésszerű használat esetén egy adag 33-99 milligramm répacukrot tartalmaz, ezért ellenjavallt örökletes gyümölcscukor (fruktóz)-intoleranciában, szőlőcukor/galaktóz felszívódási zavar esetén vagy répacukorbontó enzim/izomaltózbontó enzim hiánya esetén.

3. A gyógyszer szedésével/alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

Gyógyszerét kizárólag a betegtájékoztatóban előírt adagban és ideig alkalmazza.

A szokásos adagok a következők: naponta 3-szor 1-3 tablettá.

Bizmuttartalma miatt a székletet feketére festheti.

Ha a Bolus adstringens hatását túl erősnek vagy túl gyengének érzi, forduljon orvosához.

4. Lehetséges mellékhatások

Nincs adat mellékhatásról.

5. Tárolás

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A készítmény gyártási száma, gyártási és lejáratási ideje a dobozon található.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejáratási időn belül szabad felhasználni.

Jelen betegtájékoztató jóváhagyásának dátuma:

OGYI-T-3352/01

Betegtájékoztató OGYI eng. szám: 14 481/55/03

EGIS dok. szám: 9025