



# Bolus laxans

tabletta

## Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi vény/rendelvénnyel nem kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészeéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.

## Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a készítmény?

*Hatóanyag:*

20 mg száraz rebarbarakivonat

50 mg lecsapott kén

100 mg szennalevélpor

400 mg nehéz kaolin tablettánként.

*Segédanyagok:* talkum, szacharóz, burgonyakeményítő, magnézium-sztearát.

**Külsőalak:** zöldesszürke, kerek tablettá, egyik oldalán „B. LAXANS” jelzés található.

**Kíszerelés:** Barna üvegben 40 tablettá.

## Gyártó és a forgalombahozatali engedély jogosultja:



EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

BUDAPEST • MAGYARORSZÁG

## 1. Milyen betegségek esetén alkalmazható a készítmény?

*Javallatok:* A Bolus laxans tablettá több összetevőből álló székletlazító készítmény. A hatás kialakulásához legalább 6 órá szükséges, mivel a vegyületnek el kell jutnia a vastagbélbe.

## 2. Tudnivalók a gyógyszer szedése előtt

### Mikor nem szabad Bolus laxans tablettát szednie?

Ha a készítmény bármely összetevőjével szemben túlérzékenységet (allergiát) tapasztalt. Bélelzáródás esetén.

Terhesség, szoptatás.

A belek gyulladással járó megbetegedései esetén.

Súlyos kiszáradás, káliumhiány esetén.

Tisztázatlan eredetű hasi panaszok esetén.

### Mire figyeljen fokozottan a kezelés során?

Hosszan tartó (több mint 1–2 hét) alkalmazása kerülendő.





Tartós alkalmazás esetén előfordulhat a vastagbél barnás elszíneződése, béltónushiány, béltágulat, ionvesztés (különösen káliumvesztés, ami a szív működés zavarához és izomgyengeséghez vezethet), fehérjevizelés, vérvizelés. A vizelet színét megváltoztatja, bizonyos laboratóriumi vizsgálatok eredményét befolyásolhatja.

### **Kölcsönhatás más gyógyszerekkel**

Bizonyos gyógyszerekkel (pl. digoxin, más, szívritmuszavarra szedett gyógyszerek, egyes vízajtók, mellékvesekéreg-hormonok) egyidejűleg szedve fokozott óvatosság szükséges, mert azok hatása módosulhat. Tájékoztassa orvosát, ha Ön más gyógyszereket egyidejűleg szed.

### **Terhesség és szoptatás**

A Bolus laxans terhességben és szoptatás ideje alatt való alkalmazásáról nincs megfelelő tapasztalat, ezért fenti állapotokban feltétlenül kérjen tanácsot orvosától, mielőtt elkezdené szedni a készítményt.

### **A készítmény hatása a gépjárművezetésre és a baleseti veszéllyel járó munkavégzésre**

Nem várható, hogy a fenti képességeket befolyásolja.

### **Fontos információk a Bolus laxans tableta egyes összetevőiről**

A készítmény 37 milligramm répacukrot (szacharózt) tartalmaz. Rendeltetésszerű használat esetén egy adag 18,5–148 milligramm répacukrot tartalmaz, ezért ellenjavallt örökletes gyümölcscukor (fruktóz)-intoleranciában, szőlőcukor/galaktóz felszívódási zavar esetén vagy répacukorbontó enzim hiánya esetén.

### **3. A gyógyszer szedésével/alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók**

Gyógyszerét kizárólag a betegtájékoztatóban előírt adagban és ideig alkalmazza. Amennyiben kezelőorvosa másképp nem rendel, szokásos adagja:

**Felnőttek:** Naponta 3-szor 1–3 tableta étkezés után vagy esténként 1–4 tableta.

**Gyermekkor:** 6 év felett napi 1/2–2 tableta.

Ha a Bolus laxans tableta hatását túl erősnek vagy túl gyengének érzi, forduljon orvosához.

### **4. Lehetséges mellékhatások**

A Bolus laxans tableta általában jól tolerálható, ám mint minden gyógyszernek, így a Bolus laxansnak is lehet mellékhatása. Az esetlegesen előforduló mellékhatások (hasi fájdalom, hasi görcsök, igen ritkán májkárosodás) általában enyhék és átmenetiek.

### **Mi a teendő túladagolás esetén?**

**Tünetek:** erős hasmenés, elektrolit- és vízvesztés, ájulás.

Szándékos vagy véletlen túladagolás esetén értesítse kezelőorvosát vagy keresse fel a legközelebbi kórház sürgősségi osztályát, mivel orvosi segítségre lehet szüksége.

### **5. Hogyan kell tárolni a készítményt?**

#### **A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.**

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

OGYI-T-3353/01

Betegtájékoztató OGYI-eng. száma: 14 480/55/03

EGIS dok. szám: 9027

