

Halixol® 30 mg

tabletta

Betegtájékoztató

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

- Ez a gyógyszer orvosi vény/rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Halixol tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Halixol tabletta szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Halixol tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

Hatóanyag: 30,0 mg ambroxol-hidroklorid tablettánként

Segédanyagok: magnézium-sztearát, povidon K-30, karboximetil-keményítő-nátrium, mikrokristályos cellulóz, laktóz-monohidrát (84,0 mg)

Külsőalak: fehér vagy csaknem fehér, kerek, lapos, metszett élű, szagtalan, illetve majdnem szagtalan, egyik oldalon felezővonallal, a másik oldalon „E” és „231” jelöléssel ellátott tabletta.

Csomagolás: 20 db tabletta PVC/Alu bliszterben és falkartonban.

Gyártó és a forgalombahozatali engedély jogosultja:



EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.
BUDAPEST • MAGYARORSZÁG

1. Milyen típusú gyógyszer a Halixol tabletta és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Kórosan sűrű nyáktermeléssel járó heveny és időült légúti megbetegedések, mint például tüdőasztma, hörghurut, hörgőtágulat. A nyákköhdés elősegítése az orr-garatüreg gyulladásában. A száraz köhögést nem csillapítja.

2. Tudnivalók a Halixol tabletta szedése előtt

Ne alkalmazza a készítményt:

- ha túlérzékeny ambroxolra, bromhexinre vagy a készítmény bármely segédanyagára,
- ha terhes, vagy szoptat,
- amennyiben gyomor-bélrendszeri fekélyes megbetegedése van vagy volt.

A készítmény egyedi orvosi elbírálás alapján adható:

- a hörgők beidegzési zavarai, illetve nagyobb váladékmennyiség képződése esetén,
- súlyos veseműködési zavarban.

Terhesség, szoptatás

A készítmény alkalmazása terhesség és szoptatás alatt ellenjavallt.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Nincs arra vonatkozóan adat, hogy a Halixol tabletta a közlekedésben való biztonságos részvételét és a baleseti veszéllyel járó munka végzését befolyásolná.

Fontos információk a készítmény egyes összetevőiről:

Tejcukor-érzékenységekben figyelembe kell venni, hogy a készítmény 84,0 mg tejcukrot tartalmaz tablettánként.





A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek

A Halixol tablettát köpetűritést elősegítő hatását köhögéscsillapítók hátrányosan befolyásolhatják. Ezért egyidejű alkalmazásuk csak kifejezett orvosi utasításra történhet.

A Halixol tablettát előnye, hogy fokozza egyes antibiotikumok (amoxicillin, cefuroxim, erithromicin, doxiciklin) átjutását a hörgőváladékba.

3. Hogyan kell alkalmazni a Halixol tablettát?

Gyógyszerét kizárólag a betegtájékoztatóban leírt adagban és ideig alkalmazza!

A Halixol tablettát javasolt adagolása:

Felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek a kezelés első két-három napján 3 x 1 tablettát, később 2 x 1 vagy 3 x 1/2 tablettát naponta.

Gyermekeknek 5–12 éves kor között 2–3 x 1/2 tablettát naponta.

Gyermekeknek 2–5 éves korban a Halixol tablettát helyett – a könnyebb adagolás miatt – a Halixol szirup adása javasolt.

A tablettát étkezések után, bőséges folyadékkal kell bevenni.

A kezelés ideje alatt a bő folyadékbevitel elősegíti a gyógyszer nyákdoldó hatását.

Ha alkalmazása során hatását túlzottan erősnek érzi, vagy a készítmény csekély hatásúnak bizonyul, forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez.

Ha az előírtnál több tablettát vett be:

A túladagolás lehetséges tünetei hányinger, hányás, hasmenés és egyéb gyomor-bélrendszeri tünetek. Túladagolás gyanúja esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Az orvosi segítség megérkezéséig az első tennivaló a hánytatás.

Ha adagját elfelejtette bevenni:

Ha gyógyszerét elfelejtette bevenni, mielőbb pótolja a kimaradt adagot. Ha már a következő adag bevétele esedékes, ne vegyen be dupla adagot, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének tenné ki magát.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszernek, a Halixolnak is lehetnek mellékhatásai.

Ha az alábbi tünetek bármelyikét észleli, a Halixol tablettát szedését hagyja abba, azonnal értesítse orvosát vagy jelentkezzen a legközelebbi kórház ügyeletén, illetve értesítse a mentőket:

- az ajkak, a száj vagy a torok duzzadása, amely nyelési vagy légzési nehézséget okoz;
- ájulás vagy ájulásszerű rosszullet.

Ezek nagyon súlyos mellékhatások. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja, Önnek súlyos túlérzékenységi (allergiás) reakciója lehet a Halixol tablettával szemben.

- csalánkiütés

Allergiás reakció jele ez a tünet is. A gyógyszer szedését feltétlenül hagyja abba, a további teendőket beszélje meg kezelőorvosával. Ha a kiütések intenzíven, testszerte jelentkeznek, az esetleges súlyos tünetek megelőzése érdekében forduljon azonnal orvoshoz!

A fenti súlyos mellékhatások gyakorisága nagyon kicsi.

Az alábbi mellékhatások a leggyakoribbak: fejfájás, gyengeség, hasmenés, hányinger, gyomorpanaszok, esetleg székrekedés. A mellékhatások általában enyhék és a kezelés megszakítására csak kivételes esetekben van szükség.

Ha az itt felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb szokatlan tünetet észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészt.

5. Tárolás

Szobahőmérsékleten, 30 °C alatt, fénytől védve tárolandó.

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T-4126/01

Betegtájékoztató OGYI eng. szám: 25 879/55/2003

EGIS dok. szám: 13530