



Lidocain 5% kenőcs

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Lidocain 5% kenőcs és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Lidocain 5% kenőcs alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Lidocain 5% kenőcsöt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Tárolás

A Lidocain 5% kenőcs összetétele:

Hatóanyag: 50,0 mg lidokain 1 g kenőcsben.

Segédanyagok: Makrogol 4000, propilénglikol, makrogol 300.

Külső: Fehér színű, enyhe, jellegzetes szagú, lágy, homogén, lemosható kenőcs.

Kiszerelés: Minden doboz 1 db 20 g-os tubust tartalmaz.

Forgalomba hozatali engedély jogosultja és a készítmény gyártója

EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.

H-1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

1. Milyen betegségek esetén alkalmazható és hogyan fejt ki hatását a Lidocain 5% kenőcs?

A kenőcs hatóanyaga, a lidokain a helyi érzéstelenítők csoportjába tartozik. Helyi érzéstelenítők azok a vegyületek, amelyek az alkalmazás helyén átmenetileg felfüggesztik az idegszövet ingerületvezető képességét. A helyi érzéstelenítés során először a fájdalom szűnik meg, ezt követi a hőérzés és a tapintás megszűnése.

A Lidocain kenőcs tüneti kezelésre alkalmazható minden olyan esetben, ahol a károsodott bőrfelszín, ill. nyálkahártyák érzéstelenítésével javulás érhető el. Pl.:

- fájdalmas bőr- és nyálkahártya-elváltozások: enyhe fokú égési sérülés, bőrrepedés, horzsolás, fogínykezelés, emlőbimbó-berepedés, bőrvizketés különböző fajtái (rovarcsípés, csalánkiütés), végbélberegpedés, végbélsipoly, aranyér okozta fájdalom, röntgenbesugárzás okozta bőrkárosodás, övsömör stb.
- vizketés különböző formái: allergiás, irritatív bőrgyulladások
- fogászatban:
 - A protézis felhelyezésekor jelentkező fájdalom
 - Injekció helyének érzéstelenítése
- orvosi műszeres beavatkozások esetén.

2. Tudnivalók a Lidocain 5% kenőcs alkalmazása előtt

Mikor nem szabad lidokaintartalmú kenőcsöt alkalmazni?

A lidokain vagy a készítmény bármely segédanyaga iránti ismert túlérzékenység esetén. Bizonyos fajtájú szívélgtelenségben (kongesztív szívélgtelenség).

Alkalmazhatja-e a Lidocain kenőcsöt, ha egyéb betegsége is van?

Amennyiben Ön szívritmuszavarban, májbetegségben szenved vagy epilepsziás, fokozottan érzékeny lehet a hatóanyagra, ezért csak kisebb mennyiségeket alkalmazzon, illetve a készítmény alkalmazása előtt kérjen tanácsot orvosától.

Mire figyeljen fokozottan a kezelés során?

- A készítmény hatóanyaga sérült vagy fertőzött bőrfelszínről, nyálkahártyáról (pl. szájrég, fogíny) jobban felszívódik. Ennek különösen akkor van jelentősége, ha a hatóanyagra fokozottan érzékeny gyermeket kezel a készítménnyel. Ilyenkor kisebb mennyiséget alkalmazzon, illetve kérjen tanácsot gyógyszerésztől, orvosától.





- Szájüregben történő alkalmazás esetén, elsősorban gyermekeknél nyelési nehézséget, félrenyelést okozhat, a nyelv és a szájüregi nyálkahártya elszibbadása miatt azokat könnyebben megharaphatja a gyermek.

Alkalmazhatja-e a Lidocain kenőcsöt egyéb gyógyszerekkel együtt?

Ha betartja a kenőcs alkalmazására vonatkozó előírást, gyógyszerkölcsonhatásokra gyakorlatilag nem kell számítani.

Amennyiben szívritmusra ható gyógyszereket szed, a Lidocain kenőcs alkalmazásáról kérje ki kezelőorvosa véleményét, és semmiképpen ne használjon nagy mennyiségeket. Vigyázzon, hogy a készítménnyel kezelt felületre ne kerüljön paraffin-, vazelin-, cseranyag-, nehézfém-, jód-, jodid-, kátrány- vagy fenoltartalmú egyéb anyag!

Terhesség, szoptatás

Fennálló terhességről, szoptatásról minden gyógyszer alkalmazása előtt tájékoztassa gyógyszerészét, kezelőorvosát. A lidokain az anyatejbe kiválasztódik, ezért szoptatás esetén fokozott óvatosság szükséges. Emlőbimbó-berepedés esetén történő alkalmazásakor a szoptatást kerülni kell.

A Lidocain kenőcs terhesség, szoptatás alatt használható.

3. Hogyan kell alkalmazni a Lidocain 5% kenőcsöt?

A kezelendő bőr-, ill. nyálkahártya-felület nagyságától függően általában 0,5-2 cm-nyi kenőccsel kenje be az érintett testfelületet, vagy kenőcsös gézzel fedje be azt. Nagyobb mennyiségek nagyobb testfelületen történő alkalmazása esetén a felszívódó hatóanyag mennyisége is több. A keringésbe jutott lidokain okozta mellékhatások megelőzése érdekében a Lidocain 5% kenőcsből kb. egyharmad tubusnál (kb. 20 cm-nyi csík) többet egyszerre semmiképpen ne alkalmazzon. Ugyancsak nem javasolt 24 óra alatt egytubusnyi kenőcsnél többet felhasználni.

Amennyiben a kenőcsöt gyermek kezelésére használja, vagy Ön 65 évnél idősebb, esetleg leromlott általános állapotban van, fokozottan érzékeny lehet a hatóanyagra, ezért a fentiekben megadott mennyiségeknél kevesebbet használjon, ill. kérjen tanácsot gyógyszerészétől, orvosától. 12 éves kor alatt testsúlykilogrammonként 0,1 g kenőcs az ajánlott adag, 24 óra alatt max. 3-szor alkalmazható.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszernek, a Lidocain kenőcsnek is lehetnek mellékhatásai.

Ha az alábbi tünetek bármelyikét észleli, Önnek súlyos túlérzékenységi (allergiás) reakciója lehet a lidokainnal szemben és sürgős orvosi segítségre lehet szüksége. A készítmény alkalmazását feltétlenül hagyja abba, és értesítse orvosát vagy jelentkezzen a legközelebbi kórház ügyeletén, illetve értesítse a mentőket:

- az ajkak, a száj vagy a torok duzzadása, amely nyelési vagy légzési nehézséget okoz,
- ájulás vagy ájulászerű rosszullet.

A fenti rendkívül súlyos mellékhatások gyakorisága nagyon kicsi.

- Csalánkiütés:

A nagyon ritkán előforduló allergiás reakció jele ez a tünet is. A gyógyszer alkalmazását feltétlenül hagyja abba, a további teendőket beszélje meg orvosával. Ha a kiütések kifejezetten, testszerte jelentkeznek, az esetleges súlyos tünetek megelőzése érdekében forduljon azonnal orvoshoz!

Az alkalmazás helyén átmeneti kivörösödést, duzzanatot, érzésv zavart okozhat.

Amennyiben Ön nagyobb mennyiségű kenőcsöt használt, vagy fokozottan érzékeny a hatóanyagra, idegesség, szédülés, álomosság, vérnyomáscsökkenés, alacsony pulzusszám alakulhat ki. Túladagolás esetén is ezek a tünetek jelentkezhetnek. Ha ezek bármelyikét tapasztalja, feltétlenül forduljon orvoshoz.

Lehetséges, hogy a fenti mellékhatások egyike sem jelentkezik az Ön esetében.

Ha bármilyen, a fentiekben nem említett mellékhatást észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. Tárolás

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.

Lejáratí idő:

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejáratí időn belül szabad felhasználni.

OGYI-T-3370/01

A beteg tájékoztató OGYI-engedély száma:
30606/55/03

EGIS dok. szám: 1606/12

