

# Paxirasol<sup>®</sup> tabletta

# Paxirasol<sup>®</sup> oldat

Mielőtt elkezdene gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múlt panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek vagy éppen súlyosbodnak.

## Hatóanyag:

8 mg bromhexinium chloratum tablettánként, ill.  
120 mg bromhexinium chloratum 60 ml oldatban.

## Segédanyagok:

**Tabletta:** szilícium-dioxid (vízmentes, kolloid), magnézium-sztearát, burgonyakeményítő, mikrokristályos cellulóz.

**Oldat:** nátrium-citrát, metil-parahidroxibenzoát, citromsav (vízmentes), 85%-os glicerin, tisztított víz.

## A készítmények leírása:

**Tabletta:** fehér vagy csaknem fehér, kerek, lapos, metszett élű tabletta, egyik oldalán "P" kódjelzéssel ellátva.

**Oldat:** tiszta, színtelen, szagtalan, vagy csaknem szagtalan oldat.

## Kiszerezés:

**Tabletta:** 20 tabletta dobozonként.

**Oldat:** 60 ml oldat barna üvegbe töltve 1 műanyag mérőpohárral, kartondobozban.

## Milyen betegségek esetén alkalmazható a készítmény?

Kórosan sűrű nyák- és köpettermeléssel járó heveny és idült légúti megbetegedések kezelésére szolgáló, köptető hatású készítmény. A hörgőkből és a légcsőből a váladék eltávolítását megkönnyíti, illetve meggyorsítja, mivel a sűrű

nyákat elfolyósítja. A nyák oldását elősegíti az orr-, garatüreg gyulladásaiban. A száraz köhögést közvetlenül nem csillapítja.

## Mikor nem szabad Paxirasol készítményeket szednie?

- ha korábban a készítmény hatóanyagára és/vagy segédanyagaira, esetleg más köptetőkre (pl. az ambroxolt tartalmazó készítményekre) allergiás volt;
- ha terhes vagy szoptat;
- ha gyomor-bél rendszeri fekélyes megbetegedése van vagy volt.

## Az alábbi esetekben a Paxirasol tabletta/oldat óvatosan szedhető, ezért kérjen tanácsot orvosától:

- a hörgők beidegzési zavaraiiban, illetve nagyobb váladékmennyiség képződése esetén;
- súlyos veseműködési zavarban.

## Alkalmazható-e a készítmény terhesség és szoptatás ideje alatt?

A készítmények alkalmazása terhesség és szoptatás alatt ellenjavallt.

## Befolyásolja-e a készítmény a gépjárművezetői és gépkezelői képességeket?

Nincs arra vonatkozóan adat, hogy a Paxirasol készítmények a közlekedésben való biztonságos részvételét és a balesetveszéllyel járó munka végzését befolyásolnák.

## Szedhető-e egyéb gyógyszer a kezelés ideje alatt? Gyógyszerkölcsonhatások

- A Paxirasol készítmények köptétírtést elősegítő hatását köhögéscsillapítók (pl. kodein tartalmúak) hátrányosan befolyásolhatják, ezért egyidejű alkalmazásuk csak kifejezett orvosi utasításra történhet.
- A Paxirasol készítmények előnye, hogy fokozzák egyes antibiotikumok (ampicillin, amoxicillin, cefalexin, eritromicin, oxitetraciklin) átjutását a hörgőváladékba.



## A gyógyszerek alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

- Gyógyszerét kizárólag a betegtájékoztatóban leírt adagban és ideig alkalmazza!

### Tabletta:

Amennyiben kezelőorvosa másképp nem rendeli, szokásos adagja felnőtteknek napi 24–48 mg bromhexin: naponta 3 x 1–2 tabletta.

### Oldat:

Amennyiben kezelőorvosa másképp nem rendeli, szokásos adagja felnőtteknek: napi 3 x 1–2 ml; *belégzésre* 2 x 4 ml oldat, aeroszol készülékkel adagolva.

Az oldat adagjainak kimérésére a dobozban elhelyezett adagolómérce szolgál.

### Gyermekek napi adagja:

2 év alatt: oldat: 3 x 1 ml; tabletta: 3 x 1/2 tabl.

2–6 év: oldat: 3 x 1–2 ml; tabletta: 3 x 1/2 tabl.

6–14 év: oldat: 3 x 4 ml; tabletta: 3 x 1 tabl.

A készítményeket étkezések után, bőséges folyadékkal kell bevenni. A kezelés ideje alatt a bő folyadékbevitel elősegíti a bromhexin nyákköldő hatását.

*Gyermekeknek belégzésre csak fekvőbeteg-gyógyintézetben, orvosi felügyelet mellett alkalmazható.*

A belégzésre használt oldatot azonos mennyiségű desztillált vízzel fel kell hígítani.

A belégzés során esetleg fellépő köhögési inger megelőzése céljából, érzékeny betegek kezelésére célszerű előzetesen testhőmérsékletre melegített oldatot alkalmazni.

Vesefunkció károsodása esetén kérjen tanácsot kezelőorvosától a készítmény alkalmazása előtt, mivel lehetséges, hogy Önnek alacsonyabb dózisokra van szüksége.

## Ha az előírnál több gyógyszert vett be:

- A túladagolás lehetséges tünetei hányinger, hányás, hasmenés és egyéb gyomor-bél rendszeri tünetek.
- Túladagoljon gyanúja esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Az orvosi segítség megérkezéséig az első tennivaló a hánytartás és esetleg folyadék (tej, tea) itatása.

## Ha gyógyszerét elfelejtette bevenni:

Ha gyógyszerét elfelejtette bevenni, mielőbb pótolja a

kimaradt adagot. Ha már a következő adag bevétele esedékes, ne vegyen be dupla mennyiséget, mert ezzel már nem pótolhatja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének teszi ki magát.

## Milyen mellékhatások léphetnek fel a kezelés ideje alatt?

Mint minden gyógyszernek, így a Paxirasol tablettának/oldatnak is lehet mellékhatása.

Az alábbi mellékhatások a leggyakoribbak: fejfájás, gyengeség, hasmenés, hányinger, gyomorpanaszok, esetleg székrekedés. A mellékhatások általában enyhék, a kezelés megszakítására csak kivételes esetekben van szükség.

Allergiás reakció jele lehet a csalánkiütés is. A gyógyszer szedését feltétlenül hagyja abba, a további teendőket beszélje meg kezelőorvosával. Ha a kiütések intenzíven, testszerte jelentkeznek, az esetleges súlyos tünetek megjelenése érdekében forduljon azonnal orvoshoz!

A fentiekben nem említett mellékhatás jelentkezéséről, valamint terhesség esetleges bekövetkezéséről értesítse orvosát, gyógyszerészét!

## Hogyan kell tárolni a készítményt?

Szobahőmérsékleten (15–25 °C), fénytől védve tárolandó.

## A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni.

### Lejáratí időtartam:

- A készítmény gyártási száma, gyártási és lejáratí ideje a dobozon található.
- A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejáratí időn belül szabad felhasználni.

## A forgalombahozatali engedély jogosultja és gyártó:



EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT.  
MAGYARORSZÁG • BUDAPEST

OGYI-T-3612/01 (tabletta)

OGYI-T-3614/01 (oldat)

Betegtájékoztató OGYI eng. száma: 17.494/55/2002

EGIS dok. szám: 8832